

教师考试学科知识点汇编

第一节 小学数学

考点·四舍五入法

求近似数，看尾数最高位上的数是几，比 5 小就舍去，是 5 或大于 5 舍去尾数向前一位进

1. 已知近似数求原数，最大原数用“舍”，最小原数用“入”。

例题. 一个两位小数取近似数后是 5.8，这个两位小数最大是_____，最小是_____。

例题. 【答案】5.84；5.75. 解析：要考虑 5.8 是一个两位小数的近似数，有两种情况：“四舍”得到的 5.8 最大的是 5.84，“五入”得到的 5.8 最小的是 5.75。

考点·因数和倍数

如果数 a 能被数 b ($b \neq 0$) 整除， a 就叫做 b 的倍数， b 就叫做 a 的因数（或 a 的约数）；
倍数和因数是相互依存的；一个数的因数的个数是有限的，其中最小的因数是 1，最大的因数是它本身；
一个数的倍数的个数是无限的，其中最小的倍数是它本身。

考点·最大公因数和最小公倍数

(1) 最大公因数：几个数公有的因数，叫做这几个数的公因数。其中最大的一个，叫做这几个数的最大公因数。如果两个数是互质数，那么这两个数的最大公因数是 1。

(2) 最大公因数的性质

几个数都除以它们的最大公因数，所得的几个商是互质数；

几个数的公因数，都是这几个数的最大公因数的因数；

几个数都乘以一个自然数 n ，所得的积的最大公因数等于这几个数的最大公因数乘以 n 。

(3) 最小公倍数：几个数公有的倍数，叫做这几个数的公倍数，其中最小的一个，叫做这几个数的最小公倍数。如果两个数是互质数，那么这两个数的积就是它们的最小公倍数。

(4) 最小公倍数的性质

几个数的最小公倍数分别除以它们，所得的几个商是互质数；

几个数的公倍数，都是这几个数的最小公倍数的倍数；

几个数都乘以一个自然数 n ，所得的积的最小公倍数等于这几个数的最小公倍数乘以 n 。

最大公因数的性质与最小公倍数的性质对应记忆。

例题 1. 已知 N 是 1, 2, 3, 4, ..., 2016, 2017, 2018 这 2018 个数的最小公倍数，那么 N 等于 () 个 2 与一个奇数的连乘积。

A. 8

B. 10

C. 1009

D. 1024

例题 1. 【答案】B. 解析：由题意可知，1, 2, 3, 4, ..., 2016, 2017, 2018 这 2018 个数的最小公倍数肯定是 2 的整数次方的倍数，由于 $2^{10} = 1024 < 2018$, $2^{11} = 2048 > 2018$ ，所以 N 应为 2^{10} 与一个奇数的乘积，故选 B。

例题 2. 某条道路种植了一排树木，每两棵树间隔 35 米，共有 21 棵，现临时要求将树木的间隔缩短为 25 米，那么有 () 棵树无需移动。

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

例题 2. 【答案】D. 解析：这条道路的长为 $35 \times (21-1) = 700$ ，不需要移动的树为 25 和 35 的最小公倍数，最小公倍数为 175，则有 $\frac{700}{175} + 1 = 5$ ，故选 D.

考点·奇数和偶数

自然数按能否被 2 整除的特征可分为奇数和偶数；能被 2 整除的数叫做偶数；0 也是偶数；不能被 2 整除的数叫做奇数。

奇数与偶数的运算性质

性质 1：偶数 $\pm$ 偶数 = 偶数，奇数 $\pm$ 奇数 = 偶数

性质 2：偶数 $\pm$ 奇数 = 奇数

性质 3：偶数个奇数的和或差是偶数

性质 4：奇数个奇数的和或差是奇数

性质 5：偶数 $\times$ 奇数 = 偶数，奇数 $\times$ 奇数 = 奇数，偶数 $\times$ 偶数 = 偶数

例题. 从 0、1、2、... 9 这 10 个数中，所有的奇数和为 ().

- A. 25 B. 35
C. 45 D. 40

例题. 【答案】A. 解析：奇数和 = $1+3+5+7+9=25$.

考点·质数与合数

一个数，如果只有 1 和它本身两个约数，这样的数叫做质数（或素数），100 以内的质数有：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97；一个数，如果除了 1 和它本身还有别的约数，这样的数叫做合数；1 不是质数也不是合数，非零自然数除了 1 外，不是质数就是合数。

例题 1. 从 1、2、3……9 这 9 个数中，所有的质数的和是 ().

- A. 17 B. 18
C. 20 D. 21

例题 1. 【答案】A. 解析：这组数据中质数为 2、3、5、7，所以质数和为 $2+3+5+7=17$.

例题 2. 最小的质数与最小的合数和的倒数是_____.

例题 2. 【答案】 $\frac{1}{6}$. 解析：最小的质数是 2，最小的合数是 4，它们的和是 6，倒数是 $\frac{1}{6}$.

例题 3. 连续 9 个自然数中，最多能有_____个质数.

例题 3. 【答案】4. 解析：连续 9 个自然数中，最多由 4 个质数（素数）.

考点·倒数

乘积是 1 的两个数互为倒数；求一个数（0 除外）的倒数，只要把这个数的分子、分母调换位置；1 的倒数是 1，0 没有倒数。

例题. 下列说法正确的是 ().

- A. $24 \div 3 = 8$ ，24 是倍数，3 是因数

- B. 假分数的倒数一定小于 1
- C. 自然数不是质数，就是合数
- D. 正数大于 0，负数小于 0

例题. 【答案】D. 解析：A. 倍数和因数不能单独来说，所以错误. B. 等于 1 的假分数的倒数等于 1，所以错误. C. 自然数 1 既不是质数，也不是合数，所以错误. D 正确.

考点·基本运算

(1) 第一级运算：加法和减法叫做第一级运算.

加数+加数=和；被减数-减数=差.

(2) 第二级运算：乘法和除法叫做第二级运算.

被乘数×乘数=积；被除数÷除数=商……余数.

(3) 减法是加法的逆运算，除法是乘法的逆运算.

考点·运算顺序

(1) 没有括号的混合运算：同级运算从左往右依次运算；两级运算先算乘除法，后算加减法.

(2) 有括号的混合运算：先算小括号里面的，再算中括号里面的，最后算括号外面的.

考点·运算定律 (简便计算)

(1) 加法交换律

两个数相加，交换加数的位置，它们的和不变，即 $a+b=b+a$.

(2) 加法结合律

三个数相加，先把前两个数相加，再加上第三个数；或者先把后两个数相加，再和第一个数相加，它们的和不变，即 $(a+b)+c=a+(b+c)$.

(3) 乘法交换律

两个数相乘，交换因数的位置它们的积不变，即 $a \times b = b \times a$.

(4) 乘法结合律

三个数相乘，先把前两个数相乘，再乘第三个数；或者先把后两个数相乘，再和第一个数相乘，它们的积不变，即 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.

(5) 乘法分配律

两个数的和与一个数相乘，可以把两个加数分别与这个数相乘再把两个积相加，即 $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$. (反过来就是提取公因数)

(6) 减法的性质

从一个数里连续减去几个数，可以从这个数里减去所有减数的和，差不变，即 $a-b-c=a-(b+c)$.

拓展： $a-b-c=a-c-b$, $a-b+c=a+c-b$, $a+(b-c)=a+b-c$; $a-(b+c)=a-b-c$;

$a-(b-c)=a-b+c$; $a+b-c=a+(b-c)$; $a-b+c=a-(b-c)$, 其中 a, b, c 各表示一个数.

上面的这些运算律，既可以从左到右顺着用，又可以从右到左逆着用.

考点·加减法中的速算与巧算

(1) 凑整法

凑整法就是将算式中的数分成若干组，使每组的运算结果都是整十、整百、整千……的数，再将各组的结果相加.

- ①移位凑整法. 先把加在一起为整十、整百、整千……的数相加, 然后再与其他的数相加.
- ②借数凑整法. 有些算式中直接凑整不明显, 这时可“借数”或“拆数”凑整.
- ③分组凑整法. 把几个互为“补数”的减数先加起来, 再从被减数中减去, 或先减去那些与被减数有相同尾数的减数. 其中“补数”就是两个数相加, 如果恰好凑成整十、整百、整千……, 就把其中的一个数叫做另一个数的“补数”.

(2) 找“基准数”法:

当几个数比较接近于某一整数的数相加时, 选这个整数为“基准数”(要注意把多加的数减去, 把少加的数加上).

考点·乘法凑整 (与乘法相关运算定律相关)

思想核心: 先把能凑成整十、整百、整千……的几个乘数结合在一起, 最后再与前面的数相乘, 使得运算简便.

理论依据:

乘法交换率: $a \times b = b \times a$

乘法结合率: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

乘法分配率: $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$

积不变规律: $a \times b = (a \times c) \times (b \div c) = (a \div c) \times (b \times c)$

常见凑整: $4 \times 25 = 100$, $8 \times 125 = 1000$, $5 \times 20 = 100$,

$12345679 \times 9 = 111111111$ (去 8 数, 重点记忆).

$7 \times 11 \times 13 = 1001$ (三个常用质数的乘积, 重点记忆).

考点·提取公因数 (用途: 简便计算; 整式化简; 解方程)

思想核心: 当一个算式中, 每个乘法的运算部分中都有相同的因数时, 我们可以逆用乘法分配律, 将这个相同的数提到括号外面, 然后先计算括号内的数的加减运算, 凑整后再与外面的数相乘, 使得运算简便. 理论依据: $a \times x \pm b \times x \pm c \times x = (a \pm b \pm c) \times x$

考点·乘、除法混合运算的性质

- (1) 在乘、除混合运算中, 被乘数、乘数或除数可以连同运算符号一起交换位置 (即带着符号搬家).
- (2) 在乘、除混合运算中, 去掉或添加括号的规则
- (3) 两个数之积除以两个数之积, 可以分别相除后再相乘.

考点·要注意添括号或者去括号对运算符号的影响

- 加、乘不变, 乘注意; 减、除都变, 除注意.
- (1) 在“+”号后面添括号或者去括号, 括号内的“+”、“-”号都不变;
 - (2) 在“-”号后面添括号或者去括号, 括号内的“+”、“-”号都改变, 其中“+”号变成“-”号,“-”号变成“+”号;
 - (3) 在“ $\times$ ”号后面添括号或者去括号, 括号内的“ $\times$ ”、“ $\div$ ”号都不变, 但此时括号内不能有加减运算, 只能有乘除运算;
 - (4) 在“ $\div$ ”号后面添括号或者去括号, 括号内的“ $\times$ ”、“ $\div$ ”号都改变, 其中“ $\times$ ”号变成“ $\div$ ”号,“ $\div$ ”号变成“ $\times$ ”号, 但此时括号内不能有加减运算, 只能有乘除运算.

考点·分数与小数混合运算的技巧

技巧 1: 一般情况下, 在加、减法中, 分数化成小数比较方便.

技巧 2: 在加、减法中, 有时遇到分数只能化成循环小数时, 就不能把分数化成小数. 此时要将包括循环小数在内的所有小数都化为分数.

技巧 3: 在乘、除法中, 一般情况下, 小数化成分数计算, 则比较简便. 依据分数与除法的关系

技巧 4: 在运算中, 使用假分数还是带分数, 需视情况而定.

技巧 5: 在计算中经常用到除法、比、分数、小数、百分数相互之间的互化, 把这些常用数的互化形成表格记忆对学习非常重要.

例题. 脱式计算 (能简算的要简算, 并写出每一步计算得理由)

$$1\frac{2}{3} - \left[\left(3.62 \times \frac{2}{15} + 6.38 \div 7\frac{1}{2} \right) \times 1.82 - 1\frac{1}{3} \times 0.82 \right]$$

例题. 【答案】 $\frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned} \text{解析: } & 1\frac{2}{3} - \left[\left(3.62 \times \frac{2}{15} + 6.38 \div 7\frac{1}{2} \right) \times 1.82 - 1\frac{1}{3} \times 0.82 \right] \\ & \quad \downarrow \\ & = 1\frac{2}{3} - \left[\left(3.62 \times \frac{2}{15} + 6.38 \times \frac{2}{15} \right) \times 1.82 - 1\frac{1}{3} \times 0.82 \right] \quad (\text{除以一个数等于乘它的倒数}) \\ & \quad \downarrow \\ & = 1\frac{2}{3} - \left[(3.62 + 6.38) \times \frac{2}{15} \times 1.82 - 1\frac{1}{3} \times 0.82 \right] \quad (\text{分配律}) \\ & = 1\frac{2}{3} - \left[10 \times \frac{2}{15} \times 1.82 - 1\frac{1}{3} \times 0.82 \right] \quad (\text{求和并约分}) \\ & = 1\frac{2}{3} - 1\frac{1}{3} \times (1.82 - 0.82) \quad (\text{分配律}) \\ & = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$15 \div 10 = 15 : 10 = \frac{3}{2}$$

前项 后项 比值

考点·比与比例

1. 比的意义: 两个数相除又叫做两个数的比. 同除法比较, 比的前项相当于被除数, 后项相当于除数, 比值相当于商. 前后单位一致

2. 比例尺: (1) 数值比例尺: 图上距离: 实际距离 = 比例尺; (2) 线段比例尺: 在图上附有一条注有数目的线段, 用来表示和地面上相对应的实际距离.

3. 比例的意义: 表示两个比相等的式子叫做比例.

组成比例的四个数, 叫做比例的项. 两端的两项叫做外项, 中间的两项叫做内项.

4. 正比例和反比例: 两种相关联的量, 一种量变化, 另一种量也随着变化, 如果这两种量中相对应的两个数的比值 (也就是商) 一定, 这两种量就叫做成正比例的量, 它们的关系叫做正

图 { 正比例关系可以用一条直线来表示
象 { 反比例关系可以用光滑的曲线表示

比例关系，用字母表示 $y/x=k$ （一定）；如果这两种量中相对应的两个数的积一定，这两种量就叫做成反比例的量，它们的关系叫做反比例关系，用字母表示 $x \times y=k$ （一定）。

例题 1. $10:12 = x:30$ ，则 x 的值是（ ）。

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

例题 1. 【答案】B. 解析：根据比例的性质，内项之积等于外项之积，所以 $12x=300$ ，得 $x=25$ ，故选 B。

例题 2. 下列叙述中，正确的是（ ）。

A. 比例尺 是一种尺子 是一个比例

B. 图上距离和实际距离的比，叫作比例尺


C. 由于图纸上的图上距离小于实际距离，所以 比例尺小于 1

D. 以上都不对

该选项为易错选项，在制作精密零件时常用扩大比例尺。

例题 2. 【答案】B. 解析：比例尺是一个比例，不是尺子也不是一个数值；比例尺=图上距离：实际距离；比例尺可以放大或者缩小。所以选 B。

例题 3. 在标有“ 0 80 160km ”的地图上，1cm 表示的实际距离是（ ）。



A. 80cm

B. 160cm

C. 80km

D. 160km

例题 3. 【答案】C. 解析：一般线段比例尺中，每一小段表示图上 1 厘米，对应上面的数据表示实际距离。即 1cm 表示的实际距离为 80km，故选：C。

考点·面积和体积

1. 平面图形

(1) 长方形： $S=ab$ 。

(2) 正方形： $S=a^2$ 。

(3) 三角形： $S=\frac{ah}{2}$ 。

(4) 平行四边形： $S=ah$ 。

(5) 梯形： $S=\frac{(a+b)h}{2}$ 。

(上底+下底)×高÷2

(6) 圆： $S=\pi r^2$ 。

r 为半径

(7) 扇形： $S=\frac{n\pi r^2}{360}$ 。

(8) 环形： $S=\pi(R^2-r^2)$ 。

R 为大圆半径

(9) 弓形：一般来说，弓形面积 = 扇形面积 - 三角形面积（除了半圆）。

(10) “弯角”：如图：



“弯角”的面积 = 正方形面积 - 扇形面积。

(11) “谷子”：如图：



“谷子”的面积 = 弓形面积 × 2。

可用两个弓形面积来表示

2. 立体图形

(1) 长方体： $S=2(ab+ah+bh)$ ， $V=Sh$ ， $V=abh$ 。

(2) 正方体: $S_{表}=6a^2$, $V=a^3$.

(3) 圆柱: $S_{侧}=ch$, $S_{表}=S_{侧}+S_{底}\times 2$, $V=Sh$.


(4) 圆锥: $V=\frac{Sh}{3}$.

$V_{圆锥} = \frac{1}{3} V_{圆柱}$

3. 常用的思想方法

转化思想（复杂转化为简单，不熟悉的转化为熟悉的）；等积变形（割补、平移、旋转等）；借来还去（加减法）；外围入手（从会求的图形或者能求的图形入手，看与要求的部分之间的“关系”）。

例题 1. 如下图所示, $AF=7cm$, $DH=4cm$, $BG=5cm$, $AE=1cm$. 若正方形 $ABCD$ 内的四边形 $EFGH$ 的面积为 $78cm^2$. 则正方形的边长为 () cm .



- A. 10
C. 12

- B. 11
D. 13

例题 1. 【答案】C. 解析: 连接 GE , 得到两个直角梯形, 设正方形边长为 x , 根据题意得 $(1+5)x \div 2 + (x-1+x-5)x \div 2 - [1 \times 7 \div 2 + (x-7) \times 5 \div 2 + (x-5)(x-4) \div 2 + (x-1) \times 4 \div 2] = 78$, 整理得 $\frac{1}{2}x^2 = 72$, 解得 $x=12$, 故选 C.

例题 2. 小正方形和大正方形边长比是 $9:11$, 小正方形和大正方形面积比 ().

- A. $81:110$
C. $81:121$

- B. $101:121$
D. $101:110$

已知边长, 求面积也, 注意平方。

例题 2. 【答案】C. 解析: 面积比等于边长平方的比 $9^2:11^2=81:121$.

例题 3. 一个平行四边形的底是 10 厘米, 高是 8 厘米, 如果把它的底和高都扩大 3 倍, 那么它的面积扩大了 () 倍.

- A. 3
C. 9

- B. 6
D. 12

注意审题仔细

例题 3. 【答案】C. 解析: 对于平行四边形来说, 底扩大 a 倍, 高扩大 b 倍, 面积扩大 ab 倍, 故选 C. $3 \times 3 = 9$

例题 4. 如果梯形面积是 90 平方米, 高是 30 米, 则它的上下底之和是 () 米.

- A. 6
C. 60

$$S = \frac{(a+b) \times h}{2}$$

- B. 3
D. 30


例题 4. 【答案】A. 解析: 根据梯形的面积公式得, $90 \times 2 \div 30 = 6$, 故选 A.

例题 5. 把如图所示的长方形铁皮卷成一个深 2 分米的圆柱形小铁桶, 铁桶的底面直径是 _____ 分米, 加上底面后铁桶的容积是 _____ 升. (长: 6.28 分米, 高 2 分米)



例题 5. 【答案】2; 6.28. 解析: 铁桶的底面周长即长方形的长 6.28 分米, 则直径为 2 分米, 半径为 1 分米, 铁桶的容积为 $3.14 \times 1^2 \times 2 = 6.28$ (升).

例题 6. 求图中阴影部分的面积. (圆周率取 3.14).



例题 6. 【答案】4.56.

解析: 可将左下橄榄型的阴影部分剖开, 两部分分别顺逆时针 90° , 则阴影部分转化为四分之一圆减去一个等腰直角三角形, 所以阴影部分的面积为 $\frac{1}{4} \times \pi \times 4^2 - \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 4.56$.

考点·相遇问题

数量关系: 相遇时间 = 总路程 $\div$ (甲速 + 乙速)

相遇时间 = 总路程 $\div$ 速度和

总路程 = (甲速 + 乙速) $\times$ 相遇时间

解题思路和方法: 简单的题目可直接利用公式, 复杂的题目变通后再利用公式.

例题 1. 甲车从 A 地到 B 地需行 6 时, 乙车从 B 地到 A 地需行 10 时, 现甲乙辆车分别从 AB 两地出发相向而行, 相遇时甲车比乙车多行驶 90 千米, A、B 两地相距 () 千米.

- A. 900
C. 360

- B. 540
D. 180

例题 1. 【答案】C. 解析: 令 AB 相距 1, 则甲速度为 $\frac{1}{6}$, 乙的速度为 $\frac{1}{10}$, 甲比乙快 $\frac{1}{15}$, 两者速度和为 $\frac{4}{15}$, 故两者相遇时已经行驶了 $\frac{15}{4}$ 小时, 实际上甲车比乙车快 $90 \div \frac{15}{4} = 24$, 所以 AB 相距 $24 \div \frac{1}{15} = 360$, 故选 C.

例题 2. 甲汽车从 A 地开往 B 地, 每小时 88 公里, 乙汽车从 B 地开往 A 地, 每小时 112 公里, 两车在距离中点 36 公里处相遇, 求 AB 两地的距离是 () 公里.

- A. 200
C. 360

- B. 400
D. 600

例题 2. 【答案】D. 解析: 乙汽车比甲汽车行驶的快, 所以乙汽车比甲汽车多行驶 $36 \times 2 = 72$ 公里, 则行驶时间 $t = \frac{S_{\text{乙}} - S_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}} - V_{\text{甲}}} = \frac{72}{112 - 88} = 3$ 小时, AB 两地的距离: $s = (112 + 88) \times 3 = 600$ 公里, 故选 D.

例题 3. 两辆汽车从两地同时出发, 相向而行. 已知甲车行完全程比乙车多用 1.5 小时, 甲车每小时行 40 千米, 乙车每小时行 50 千米, 出发后 _____ 小时两车相遇.

例题 3. 【答案】 $3\frac{1}{3}$. 解析: $1.5 \div \left(\frac{1}{40} - \frac{1}{50}\right) = 300$ (千米), $300 \div (40 + 50) = 3\frac{1}{3}$ (小时).

考点·追及问题

与相遇问题对比
记忆, 借助图理解。

数量关系: $\text{追及时间} = \text{追及路程} \div (\text{快速} - \text{慢速})$

$\text{追及路程} = (\text{快速} - \text{慢速}) \times \text{追及时间}$

例题. 一件商品先涨价 5% 后又降价 5%, ()。

A. 现价比原价低

B. 现价比原价高

C. 现价和原价一样

D. 无法确定

例题. 【答案】 A. 解析: 设原价是 100 元, 涨价 5% 是: $100 \times (1 + 5\%) = 105$ (元), 又降价 5% 得: $105 \times (1 - 5\%) = 99.75$ 元, $99.75 < 100$, 则现价比原价低, 故选 A.

考点·植树问题

注意场地形状与
端点是否植树。

数量关系: $\text{线形植树棵数} = \text{距离} \div \text{棵距} + 1$

$\text{环形植树棵数} = \text{距离} \div \text{棵距}$

$\text{方形植树棵数} = \text{距离} \div \text{棵距} - 4$ (注: 端点不植树)

$\text{三角形植树棵数} = \text{距离} \div \text{棵距} - 3$ (注: 端点不植树)

$\text{面积植树棵数} = \text{面积} \div (\text{棵距} \times \text{行距})$

解题思路和方法: 先弄清楚植树问题的类型, 然后可以利用公式。

例题 1. 广场上的大钟 4 时敲 4 下, 要 12 秒, 9 时敲 9 下, 用 () 秒。

A. 3

B. 27

C. 32

D. 36

例题 1. 【答案】 C. 解析: 敲 4 下, 要经历 $4 - 1 = 3$ 个间隔, 那么每个间隔所经历的时间是: $12 \div 3 = 4$ (秒), $\therefore$ 敲 9 下需要的时间是: $(9 - 1) \times 4 = 32$ (秒)

例题 2. 王亮要把一封特快邮件送到五楼李奶奶家, 如果相邻两层之间有 26 个台阶, 那么王亮从一楼到五楼一共要走 () 个台阶。

A. 78

B. 91

C. 104

D. 130

例题 2. 【答案】 C. 解析: 从 1 楼到 5 楼之间有 4 个空隙, 每个空隙的台阶是 26 个, 所以共走 104 个台阶。

考点·年龄问题

数量关系: 年龄问题往往与和差, 和倍, 差倍问题有着密切联系, 尤其与差倍问题的解题思路是一致的, 要紧紧抓住“年龄差不变”这个特点。

解题思路和方法: 可以利用“差倍问题”的解题思路和方法。

考点·行船问题

注意考虑水本身
的速度。画图理
解。

数量关系: $(\text{顺水速度} + \text{逆水速度}) \div 2 = \text{船速}$

$(\text{顺水速度} - \text{逆水速度}) \div 2 = \text{水速}$

$\text{顺水速} = \text{船速} \times 2 - \text{逆水速} = \text{逆水速} + \text{水速} \times 2$

逆水速 = 船速 $\times$ 2 - 顺水速 = 顺水速 - 水速 $\times$ 2

解题思路和方法：大多数情况可以直接利用数量关系的公式。

考点·列车问题

(1) 列车过桥（隧道）

列车车长 + 桥（隧道）长度（总路程） = 列车速度 $\times$ 通过的时间

(2) 列车 + 树（电线杆）

列车车长（总路程） = 列车速度 $\times$ 通过时间

(3) 列车 + 列车

错车问题：相当于相遇问题

快车车长 + 慢车车长（总路程） = （快车速度 + 慢车速度） $\times$ 错车时间

超车问题：相当于追及问题

快车车长 + 慢车车长（总路程） = （快车速度 - 慢车速度） $\times$ 错车时间

例题：一列高速列车和一列普通列车的车身体分别为 400 米和 600 米，它们相向匀速行驶在平行的轨道上，若坐在高速列车的乘客看见普通列车驶过窗口的时间是 3 秒，则坐在普通列车上的乘客看见高速列车驶过窗口的时间是（ ）。

A. 2 秒

B. 3 秒

C. 4 秒

D. 4.5 秒

例题。【答案】A。解析：两车的相对速度是每秒 200 米。所以 $400 \div 200 = 2$ （秒）。

考点·时钟问题

数量关系：分针的速度是时针的 12 倍，

通常按追及问题来对待，也可以按差倍问题来计算。

解题思路和方法：变通为“追及问题”后可以直接利用公式。

考点·工程问题

工作量 = 工作效率 $\times$ 工作时间

工作时间 = 工作量 $\div$ 工作效率

合作：工作时间 = 总工作量 $\div$ （甲工作效率 + 乙工作效率）

解题思路和方法：变通后可以利用上述数量关系的公式。

例题：甲、乙、丙三人生产一批玩具，甲生产的个数是乙、丙二人生产个数之和的 $\frac{1}{2}$ ，乙生产的个数是甲、丙两人生产个数之和的 $\frac{1}{3}$ ，丙生产了 50 个。这批玩具共有_____个。

例题。【答案】120 个。解析：如果直接研究甲、乙、丙三者之间的关系，可能会略显复杂，我们需要引入一个中间量：甲乙丙三人生产玩具数量的总和。甲是乙丙和的 $\frac{1}{2}$ ，则总和分为 3 份，甲占了 1 份，甲占总数的 $\frac{1}{3}$ ；乙是甲丙和的 $\frac{1}{3}$ ，同理可知乙占了总数的 $\frac{1}{4}$ ，那么可知丙生产的玩具占总数的 $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ ，所以总数是 $50 \div \frac{5}{12} = 120$ （个）。

考点·鸡兔同笼问题 *一般使用假设法或列方程形式解答*

数量关系：第一鸡兔同笼问题

假设全都是鸡，则有：兔数 = $(\text{实际脚数} - 2 \times \text{鸡兔总数}) \div (4 - 2)$

假设全都是兔，则有：鸡数 = $(4 \times \text{鸡兔总数} - \text{实际脚数}) \div (4 - 2)$

第二鸡兔同笼问题

假设全都是鸡，则有兔数 = $(2 \times \text{鸡兔总数} - \text{鸡与兔脚之差}) \div (4 + 2)$

假设全都是兔，则有鸡数 = $(4 \times \text{鸡兔总数} + \text{鸡与兔脚之差}) \div (4 + 2)$

解题思路和方法：解答此类题目一般都用假设法，可以先假设都是鸡，也可以假设都是兔。如果先假设都是鸡，然后以兔换鸡；如果先假设都是兔，然后以鸡换兔。这类问题也叫置换问题。通过先假设，再置换，使问题得到解决。

例题 1. 学校举行“趣味数学”竞赛共 20 道题，评分标准是：每做对一题得 5 分，每做错或不做一题倒扣 1 分；小明参加了这次竞赛得到 82 分，则小明分别做对了几道题？做错或不做的有几道题？

此问题使用假设法且假设全做对更快捷

例题 1. 【答案】17, 3. 解析：假设全做对， $20 \times 5 = 100$ ，实际 82 分，说明有做错的， $100 - 82 = 18$ ，每错一道少 6 分，少了 18 分，所以错了 $18 \div 6 = 3$ 道，做对了 $20 - 3 = 17$ 道。

例题 2. 鸡与兔共有 100 只，鸡的脚比兔的脚多 80 只，问鸡与兔各多少只？

例题 2. 【答案】鸡有 80 只，兔有 20 只。

解析：兔： $(2 \times 100 - 80) \div (2 + 4) = 20$ （只），鸡： $100 - 20 = 80$ （只），则鸡有 80 只，兔有 20 只。

考点·商品利润问题

数量关系：利润 = 售价 - 进货价

利润率 = $(\text{售价} - \text{进货价}) \div \text{进货价} \times 100\%$

售价 = 进货价 $\times (1 + \text{利润率})$

亏损 = 进货价 - 售价

亏损率 = $(\text{进货价} - \text{售价}) \div \text{进货价} \times 100\%$

解题思路和方法：简单的题目可以直接利用公式，复杂的题目变通后利用公式。

例题 1. 一条裙子标价 230 元，在甲店打五折出售，在乙店按“满 100 元减 50 元”的方式出售。比较这条裙子在两店的售价，结果是（ ）。

A. 甲店便宜

B. 乙店便宜

C. 售价一样

D. 无法确定

例题 1. 【答案】A. 解析：在甲店： $230 \times 50\% = 115$ （元），在乙店， $230 - 50 \times 2 = 130$ （元），所以甲店便宜。

五折 = 50% 售价 = 标价 $\times$ 折扣

例题 2. 某商店用 2400 元买进一批货物，如果全用每个 6 元的价格卖出，可得利润 25%，实际上一部分货物因质量问题，只能降价以每个 5 元的价格卖出，因此得利润 20%，这些货物中，以 6 元的价格卖出的合格品是多少个？

例题 2. 【答案】380 个。

解析：如果全以 6 元的价格卖出，可得 $2400 \times (1 + 25\%) = 3000$ 元，

则货物共有 $3000 \div 6 = 500$ 个，实际总售价为 $2400 \times (1 + 20\%) = 2880$ 元，

以 5 元卖出的有 $(3000-2880) \div (6-5) = 120$ 个，
 则以每个 6 元的价格卖出的有 $500-120=380$ 个。

第二节 初中数学

考点·整式的运算

1. 幂的运算性质: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(ab)^n = a^n b^n$.

2. 乘法公式

$$(1) (x+p)(x+q) = x^2 + (p+q)x + pq.$$

$$(2) (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

$$(3) (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(4) (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

注意: 幂的积与幂的乘方的区别.

3. 整式的除法

(1) 单项式除以单项式的法则: 把系数、同底数幂分别相除, 作为商的因式; 对于只在被除式里含有的字母, 则连同它的指数一起作为商的一个因式.

(2) 多项式除以单项式的法则: 先把这个多项式的每一项分别除以单项式, 再把所得的商相加.

例题 1. 下列计算正确的是 ().

A. $2x^2 - 4x^2 = -2$

B. $3x + x = 3x^2$

C. $3x \cdot x = 3x^2$

D. $4x^6 \div 2x^2 = 2x^3$

同底数幂相除, 底数不变, 指数相减.

例题 1. 【答案】C. 解析: A. $2x^2 - 4x^2 = -2x^2$, 错误. B. $3x + x = 4x$, 错误. C. $3x \cdot x = 3x^2$, 正确. D. $4x^6 \div 2x^2 = 2x^4$, 错误. 故选: C.

例题 2. 下列运算正确的是 ().

A. $(a^2 + 2b^2) - 2(-a^2 + b^2) = 3a^2 + b^2$

B. $\frac{a^2+1}{a-1} - a - 1 = \frac{2a}{a-1}$

C. $(-a)^{3m} \div a^m = (-1)^m a^{2m}$

D. $6x^2 - 5x - 1 = (2x-1)(3x-1)$

例题 2. 【答案】C. 解析: A 项应等于 $3a^2$; B 项应等于 $\frac{2}{a-1}$; D 项应等于 $(6x+1)(x-1)$.

例题 3. 下列计算正确的是 ().

A. $a^2 + a^3 = a^5$

B. $3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 1$

C. $(x^2)^3 = x^5$

D. $m^5 \div m^3 = m^2$

幂的乘方, 底数不变, 指数相乘.

例题 3. 【答案】D. 解析: A. a^2 与 a^3 不是同类项, 无法计算, 故此选项错误; B. $3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$,

故此选项错误; C. $(x^2)^3 = x^6$, 故此选项错误; D. $m^5 \div m^3 = m^2$, 正确. 故选 D.

考点·因式分解

1. 因式分解的方法: (1) 提取公因式法; (2) 公式法; (3) 十字相乘法; (4) 分组分解法.

2. 提公因式法: $ma+mb+mc=m(a+b+c)$.

3. 公式法

$$(1) a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).$$

$$(2) a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2.$$

$$(3) a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2.$$

4. 十字相乘法: $x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$.

例题 1. 下列等式从左到右的变形, 属于因式分解的是 ().

A. $x^2 + 2x - 1 = (x-1)^2$

B. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

C. $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$

D. $ax^2 - a = a(x^2 - 1)$

例题 1. 【答案】C. 解析: A. $x^2 + 2x - 1 = (x+1)^2 - 2$, 故 A 不是因式分解; B. 是整式的乘法,

故 B 不是因式分解; C. 是因式分解; D. $ax^2 - a = a(x^2 - 1) = a(x-1)(x+1)$, 故 D 分解不完全. 故

选 C. 对于因式分解的选择题也可以逐项从等式右边展开, 进行验证和排除.

例题 2. 因式分解 $x^2 + ax + b$, 甲看错了 a 的值, 分解的结果是 $(x+6)(x-2)$, 乙看错了 b 的值, 分解的结果为 $(x-8)(x+4)$, 那么 $x^2 + ax + b$ 分解因式正确的结果为 ().

A. $(x+3)(x-4)$

B. $(x+4)(x-3)$

C. $(x+6)(x-2)$

D. $(x+2)(x-6)$

例题 2. 【答案】D. 解析: 甲看错了 a 的值: $x^2 + ax + b = (x+6)(x-2) = x^2 + 4x - 12$,

$\therefore b = -12$, 乙看错了 b 的值: $x^2 + ax + b = (x-8)(x+4) = x^2 - 4x - 32$, $\therefore$

$a = -4$, $\therefore x^2 + ax + b$ 分解因式正确的结果: $x^2 - 4x - 12 = (x-6)(x+2)$. 故选 D.

例题 3. 分解因式: $m^3n - 6m^2n + 9mn =$ _____.

例题 3. 【答案】 $mn(m-3)^2$.

解析: $m^3n - 6m^2n + 9mn = mn(m^2 - 6m + 9) = mn(m-3)^2$.

考点·二次根式

1. 二次根式的有关概念

被开方数 $a \geq 0$.

(1) 二次根式: 式子 $\sqrt{a} (a \geq 0)$ 叫做二次根式. 注意被开方数 a 只能是非负数, 并且根式 $\sqrt{a}$ 也是非负数.

(2) 最简二次根式: 被开方数不含分母, 不含能开得尽方的因数或因式, 这样的二次根式, 叫做最简二次根式.

(3) 同类二次根式: 化成最简二次根式后, 被开方数相同的几个二次根式, 叫做同类二次根式.

2. 二次根式的性质

(1) $\sqrt{a} \geq 0 (a \geq 0)$.

(2) $(\sqrt{a})^2 = a (a \geq 0)$.

(3) $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$.

(4) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} (a \geq 0, b \geq 0)$.

(5) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} (a \geq 0, b > 0)$.

3. 二次根式的运算

(1) 二次根式的加减: 先把二次根式化为最简二次根式, 再合并同类二次根式.

(2) 二次根式的乘除: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} (a \geq 0, b \geq 0)$; $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} (a \geq 0, b > 0)$.

(3) 二次根式的运算仍满足运算律, 也可以用多项式的乘法公式来简化运算. 二次根式的运算结果一定要化成最简二次根式.

例题 1. 已知 $m=1+\sqrt{2}$, $n=1-\sqrt{2}$, 则代数式 $\sqrt{m^2+n^2-3mn}$ 的值为 ().

- A. 9 B. ± 3
C. 3 D. 5

例题 1. 【答案】C. 解析:

$$\sqrt{m^2+n^2-3mn} = \sqrt{(m-n)^2 - mn} = \sqrt{(1+\sqrt{2}-1+\sqrt{2})^2 - (1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (-1)} = 3, \text{ 故选 C.}$$

例题 2. 计算 $\sqrt{12} - 3\sqrt{\frac{1}{3}}$ 的结果是_____.

例题 2. 【答案】 $\sqrt{3}$. 解析: 原式 $= 2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$.

考点·一元二次方程

1. 一般形式: $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$.

2. 解法: 直接开平方法; 配方法; 公式法 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} (b^2-4ac \geq 0)$; 因式分解法.

3. 根的判别式: 通常用“ Δ ”来表示, 即 $\Delta = b^2 - 4ac$.
 $\begin{cases} \Delta > 0, \text{方程有两个不同的实根;} \\ \Delta = 0, \text{方程有且只有一个实根;} \\ \Delta < 0, \text{无实根.} \end{cases}$

4. 根与系数的关系: 如果方程 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 的两个实数根是 x_1, x_2 , 那么 $x_1+x_2 = -\frac{b}{a}$,

$$x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

对于复杂的一元二次方程, 不方便求根时, 可利用根与系数的关系求解.

例题 1. 若 a, b 是方程 $x^2+2x-2006=0$ 的两根, 则 $a^2+3a+b = ()$.

- A. 2006 B. 2005
C. 2004 D. 2002

例题 1. 【答案】C. 解析: $\because a, b$ 是方程 $x^2+2x-2006=0$ 的两根, $\therefore x^2+2x=2006, a+b=-2$, 所以有 $a^2+3a+b = a^2+2a+a+b = 2006-2 = 2004$.

例题 2. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2+(m+2)x=0$ 有两个相等的实数根, 则实数 m 的值为 ().

- A. 2 B. -2
C. -2 或 2 D. -1 或 3

马上反应 $\Delta=0$, 列出关于 m 的方程, 求解即可.

例题 2. 【答案】B. 解析: $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2+(m+2)x=0$ 有两个相等的实数根,

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (m+2)^2 = 0, \text{ 解得 } m = -2. \text{ 故选 B.}$$

例题 3. 方程 $2x^2-3x-1=0$ 的两根为 x_1, x_2 , 则 $x_1^2+x_2^2 =$ _____.

例题 3. 【答案】 $\frac{13}{4}$. 解析: $\because$ 方程 $2x^2-3x-1=0$ 的两根为 x_1, x_2 , $\therefore x_1+x_2 = \frac{3}{2}, x_1x_2 = -\frac{1}{2}$,

$$\therefore x_1^2+x_2^2 = (x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4}. \text{ 故答案为: } \frac{13}{4}.$$

考点·不等式

1. 不等式的基本性质

(1) 若 $a < b$, 则 $a + c < b + c$.

(2) 若 $a > b$, $c > 0$, 则 $ac > bc$ (或 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$).

(3) 若 $a > b$, $c < 0$, 则 $ac < bc$ (或 $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$).

2. 一元一次不等式组解集的确定方法 (已知 $a < b$)

$\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$ 的解集是 $x < a$, 即 “小小取小”;

$\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$ 的解集是 $x > b$, 即 “大大取大”;

$\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$ 的解集是 $a < x < b$, 即 “大小小大中间找”;

$\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$ 的解集是空集, 即 “大大小小取不了”.

例题 1. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2x-1 > 5 \\ x-m < 0 \end{cases}$ 有三个整数解, 则 m 的取值范围是 ().

A. $6 < m \leq 7$

B. $6 < m < 7$

C. $m \leq 7$

D. $m < 7$

例题 1. 【答案】A. 解析: $\begin{cases} 2x-1 > 5 \text{ ①} \\ x-m < 0 \text{ ②} \end{cases}$, 由①得: $x > 3$, 由②得: $x < m$, 则不等式组的

解集是: $3 < x < m$. 不等式组有三个整数解, 则整数解是 4, 5, 6. 则 $6 < m \leq 7$. 故选 A.

例题 2. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-m < 0 \\ 3-2x \leq 1 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解, 则 m 的取值范围是_____.

例题 2. 【答案】 $3 < m \leq 4$. 解析: $\begin{cases} x-m < 0 \text{ ①} \\ 3-2x \leq 1 \text{ ②} \end{cases}$ 解①得: $x < m$, 解②得: $x \geq 1$, 则不等式

组的解集是: $1 \leq x < m$. 不等式组有 3 个整数解, 则整数解是 1, 2, 3. 则 $3 < m \leq 4$. 故答案是: $3 < m \leq 4$.

考点·分式

1. 分式的基本性质: 分式的分子与分母同乘 (或除以) 一个不等于零的整式, 分式的值不变. 用式子表示是 $\frac{A}{B} = \frac{A \times M}{B \times M}, \frac{A}{B} = \frac{A \div M}{B \div M}$ (其中 M 是不等于 0 的整式).

2. 分式的加减法: 同分母的分式相加减, 分母不变, 把分子相加减, 即 $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$. 异分母的分式相加减, 先通分, 变为同分母的分式, 然后相加减, 即 $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$.

3. 分式的乘法：分式乘以分式，用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母，即

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

分式除以分式，把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘，即 $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$

4. 分式的混合运算：在分式的加减乘除混合运算中，应先算乘除，进行约分化简后，再进行加减运算，遇到有括号的，先算括号里面的。运算结果必须是最简分式或整式。

即结果需要约分，需要掌握约分的整除性知识

化简与计算 ← 例题 1. 化简 $\frac{a}{a-1} + \frac{1}{1-a} =$ _____.

需要保持分母一致才能进行加减运算 例题 1. 【答案】1. 解析：此题考查分式的加法运算，分式的加法是把分母变成相同，通过

通分把分母变成相同，然后把分子进行相加即可；所以原式 $= \frac{a}{a-1} - \frac{1}{a-1} = \frac{a-1}{a-1} = 1$ ；故答案为 1.

例题 2. 先化简，再求值： $\left(\frac{a^2}{a-3} + \frac{9}{3-a} \right) \div \frac{a+3}{a+2}$ ，其中 $a=2$.

例题 2. 【答案】4.

解析：原式 $= \frac{(a+3)(a-3)}{a-3} \times \frac{a+2}{a+3} = a+2$ ，当 $a=2$ 时，原式 $= 4$.

例题 3. 先化简再求值： $\left(\frac{6}{x-1} + \frac{4}{x^2-x} \right) \div \frac{3x+2}{x-1}$ ，其中 $x=2$.

例题 3. 【答案】 $\left(\frac{6}{x-1} + \frac{4}{x^2-x} \right) \div \frac{3x+2}{x-1} = \frac{2}{x} = 1$.

(x-1)与(x^2-x)通分过程中，找最简公分母，即x(x-1) 解析： $\left(\frac{6}{x-1} + \frac{4}{x^2-x} \right) \div \frac{3x+2}{x-1} = \frac{6x+4}{x(x-1)} \div \frac{3x+2}{x-1} = \frac{2(3x+2)}{x(x-1)} \cdot \frac{x-1}{3x+2} = \frac{2}{x}$ ，





当 $x=2$ 时，原式 $= \frac{2}{2} = 1$.

例题 4. 计算： $\left[\frac{1}{x+1} + \frac{x^2-2x+1}{x^2-1} \right] \div \frac{x-1}{x+1}$.

例题 4. 【答案】 $\frac{x}{x-1}$.

解析： $\left[\frac{1}{x+1} + \frac{x^2-2x+1}{x^2-1} \right] \div \frac{x-1}{x+1} = \frac{x-1+x^2-2x+1}{x^2-1} \cdot \frac{x+1}{x-1} = \frac{x^2-x}{x^2-1} \cdot \frac{x+1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$.

考点 • 一次函数 $y=kx+b$ 的图象与性质

k, b 的符号	$k>0, b>0$	$k>0, b<0$	$k<0, b>0$	$k<0, b<0$
图象的大致位置				
经过象限	第一、二、三象限	第一、三、四象限	第一、二、四象限	第二、三、四象限
性质	y 随 x 的增大而增大		y 随 x 的增大而减小	

即： $k>0, x \uparrow, y \uparrow$; $k<0, x \uparrow, y \downarrow$

例题 1. 已知一次函数的图象过点 $(3, 5)$ 与 $(-4, -9)$ ，则这个一次函数的解析式为 _____.

过两点求直线方程的方法有：两点式；点斜式；斜截式等

例题 1. 【答案】 $y=2x-1$. 解析: 设一次函数的解析式为 $y=kx+b$, 则 $\begin{cases} 5=3k+b \\ -9=-4k+b \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} k=2 \\ b=-1 \end{cases}$, 所以一次函数解析式为 $y=2x-1$.

例题 2. 若函数 $y=3x+m$ 与函数 $y=-3x+n$ 交于点 $(a, 16)$, 则 $m+n=$ _____.


例题 2. 【答案】32. 解析: 由函数 $y=3x+m$ 与函数 $y=-3x+n$ 交于点 $(a, 16)$, $\therefore 3a+m=16$, $-3a+n=16$, 两式相加得: $m+n=32$, 故答案为 32.

考点·反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与性质





k 的符号	$k>0$	$k<0$
图象的大致位置		
经过象限	第一、第三象限	第二、第四象限
性质	在每一象限内 y 随 x 的增大而减小	在每一象限内 y 随 x 的增大而增大

易错点注意: 需要说明哪一个象限, 而不能一概而论, 这是错误的.

例题 1. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle B=90^\circ$, $AC=4$, $AB \parallel CD$, DH 垂直平分 AC , 点 H 为垂足, 设 $AB=x$, $AD=y$, 则 y 关于 x 的函数关系用图像可以表示为 ().



本质: 找 y 与 x 的函数解析式, 再找图像
手段: 全等与相似.



例题 1. 【答案】D. 解析: 由题意知 $AH=HC=2$, $\angle DHA=\angle DHC=90^\circ$, 于是 $\triangle DHA \cong \triangle DHC$, 因此 $\angle DCA=\angle DAC$, 又因为 $AB \parallel CD$, 则 $\angle DCA=\angle CAB$, 于是 $\angle DAC=\angle CAB$, 又 $\angle DHA=\angle CBA=90^\circ$, 可知 $\triangle DHA \sim \triangle CBA$, 于是 $\frac{AH}{AB}=\frac{DA}{CA}$, 得 $\frac{2}{x}=\frac{y}{4}$, 即 $y=\frac{8}{x}$, 因为 $AB<AC$,


所以 $x < 4$ ，正确选项为 D。

例题 2. 如图，反比例 $y = \frac{4}{x}$ 的图象与一次函数 $y = kx - 3$ 的图象在第一象限内交于 $A(4, a)$ 。

(1) 求一次函数的解析式；

(2) 若直线 $x = n (0 < n < 4)$ 与反比例函数和一次函数的图象分别交于点 B, C，连接 AB，

若 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，求 n 的值。




注意： $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，可能会涉及分类讨论的情况，需要结合实际情况做出判断。

例题 2. 【答案】(1) $y = x - 3$ ；(2) 1。

解析：(1) $\because$ 反比例 $y = \frac{4}{x}$ 的图象过点 $A(4, a)$ ， $\therefore a = \frac{4}{4} = 1$ ， $\therefore A(4, 1)$ ，把 $A(4, 1)$ 代入一次函数 $y = kx - 3$ ，得 $4k - 3 = 1$ ， $\therefore k = 1$ ， $\therefore$ 一次函数的解析式为 $y = x - 3$ ；

(2) 由题意可知，点 B、C 的坐标分别为 $(n, \frac{4}{n})$ ， $(n, n - 3)$ 。设直线 $y = x - 3$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 D、E，如图，




当 $x = 0$ 时， $y = -3$ ；当 $y = 0$ 时， $x = 3$ ， $\therefore OD = OE$ ， $\therefore \angle OED = 45^\circ$ 。 $\because$ 直线 $x = n$ 平行于 y 轴， $\therefore \angle BCA = \angle OED = 45^\circ$ ， $\therefore \triangle ABC$ 是等腰直角三角形，且 $0 < n < 4$ ， $\therefore$ 只有 $AB = AC$ 一种情况，过点 A 作 $AF \perp BC$ 于 F，则 $BF = FC$ ， $F(n, 1)$ ， $\therefore \frac{4}{n} - 1 = 1 - (n - 3)$ ，解得 $n_1 = 1$ ， $n_2 = 4$ ，


$\because 0 < n < 4$ ， $\therefore n_2 = 4$ 舍去， $\therefore n$ 的值是 1。

例题 3. 如图，在矩形 OABC 中， $OA = 6$ ， $OC = 4$ ，F 是 AB 上的一个动点 (F 不与 A, B 重合)，过点 F 的反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图象与 BC 边交于点 E。

(1) 当 F 为 AB 的中点时，求该函数的解析式；

(2) 当 k 为何值时， $\triangle EFA$ 的面积最大，最大面积是多少？





例题 3.【答案】(1)该函数的解析式为 $y = \frac{12}{x} (x > 0)$; (2)当 $k = 12$ 时, S 有最大值, $S_{\text{最大}} = 3$.

解析: (1) $\because$ 在矩形 OABC 中, $OA = 6$, $OC = 4$, $\therefore B(6, 4)$,

$\because F$ 为 AB 的中点, $\therefore F(6, 2)$,

又 $\because$ 点 F 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图象上, $\therefore k = 12$,

$\therefore$ 该函数的解析式为 $y = \frac{12}{x} (x > 0)$.

(2) 由题意知 E, F 两点坐标分别为 $E\left(\frac{k}{4}, 4\right)$, $F\left(6, \frac{k}{6}\right)$,

$$\begin{aligned} \therefore S_{\triangle EFA} &= \frac{1}{2} AF \cdot EB = \frac{1}{2} \times \frac{k}{6} \left(6 - \frac{k}{4}\right), \\ &= \frac{k}{2} - \frac{k^2}{48} = -\frac{1}{48}(k^2 - 24k) = -\frac{1}{48}[(k-12)^2 - 144] = -\frac{1}{48}(k-12)^2 + 3, \end{aligned}$$

$\therefore$ 当 $k = 12$ 时, S 有最大值, $S_{\text{最大}} = 3$.

考点·二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数, $a \neq 0$) 的图象与性质

a 的符号	$a > 0$	$a < 0$
图象		
开口方向	开口向上	开口向下
对称轴	直线 $x = -\frac{b}{2a}$	直线 $x = -\frac{b}{2a}$
顶点坐标	$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$	$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$
增减性	当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大	当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小
最值	当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 有最小值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$	当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 有最大值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$

关联开口方向即 a 的正负情况

例题 1. 把抛物线 $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 向左平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位, 则所得抛物线的解析式为_____.

函数的平移: 左加右减 $\rightarrow x$
上加下减 $\rightarrow y$

点的平移: 左减右加 $\rightarrow x$
上加下减 $\rightarrow y$

报名专线: 400-6300-999


例题 1. 【答案】 $y = \frac{1}{2}x^2$. 解析: $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 向左平移 1 个单位后得到的解析式为

$y = \frac{1}{2}x^2 + 2$, 再向下平移 2 个单位, 得到的解析式为 $y = \frac{1}{2}x^2$. 左加右减, 上加下减. 左右直接对 x 加减, 加括号; 上下在最后加减.

例题 2. 如图, 一次函数 $y = kx + b$ 的图象与二次函数 $y = -x^2 + c$ 的图象相交于

$A(-1, 2)$, $B(2, n)$ 两点.

- (1) 求一次函数和二次函数的解析式;
- (2) 根据图象直接写出使二次函数的值大于一次函数的值的 x 的取值范围;
- (3) 设二次函数 $y = -x^2 + c$ 的图象与 y 轴相交于点 C , 连接 AC , BC , 求 $\triangle ABC$ 的面积.



例题 2. 【答案】 (1) $y = -x + 1$; (2) $-1 < x < 2$; (3) 3.

解析: (1) 把 $A(-1, 2)$ 代入 $y = -x^2 + c$ 得: $-1 + c = 2$, 解得: $c = 3$,

代入求解.

$\therefore y = -x^2 + 3$, 把 $B(2, n)$ 代入 $y = -x^2 + 3$ 得: $n = -1$, $\therefore B(2, -1)$;


把 $A(-1, 2)$ 、 $B(2, -1)$ 分别代入 $y = kx + b$, 得 $\begin{cases} -k + b = 2 \\ 2k + b = -1 \end{cases}$ 解得: $\begin{cases} k = -1 \\ b = 1 \end{cases}$,

$\therefore y = -x + 1$;

在上方时, 函数值大. (2) 根据图象得: 使二次函数的值大于一次函数的值的 x 的取值范围是 $-1 < x < 2$;

(3) 连接 AC 、 BC , 设直线 AB 交 y 轴于点 D ,

不规则: 分割为 2 个三角形, 分别计算.



把 $x=0$ 代入 $y=-x^2+3$ 得: $y=3$, $\therefore C(0,3)$; 把 $x=0$ 代入 $y=-x+1$ 得: $y=1$, $\therefore D(0,1)$,

$$\therefore CD=3-1=2, \text{ 则 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1+1=2.$$

考点·等腰三角形

1. 等腰三角形的性质与判定

(1) 等腰三角形的性质

① 等腰三角形的两个底角相等 (简称为“等边对等角”).

② 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合 (简称为“三线合一”).

③ 等腰三角形是轴对称图形.

(2) 等腰三角形的判定: 如果一个三角形有两个角相等, 那么这两个角所对的边也相等 (简称为“等角对等边”).

2. 等边三角形的性质与判定

(1) 等边三角形的性质

① 等边三角形的内角相等, 且都等于 60° .

② 等边三角形的三条边都相等.

③ 等边三角形同样具有“三线合一”的性质.

④ 等边三角形是轴对称图形, 有三条对称轴.


(2) 等边三角形的判定

① 三条边相等的三角形是等边三角形.

② 三个角相等的三角形是等边三角形.

③ 有一个角为 60° 的等腰三角形是等边三角形.

例题. 如图, D 为 $\triangle ABC$ 内一点, CD 平分 $\angle ACB$, $BE \perp CD$, 垂足为 D, 交 AC 于点 E, $\angle A = \angle ABE$, $AC=5$, $BC=3$, 则 BD 的长为 ().



- A. 1
C. 2

- B. 1.5
D. 2.5

$$\text{全等} \Rightarrow CE = 3$$

$$AE = 5 - 3 = 2$$

$$BD = \frac{1}{2} BE \text{ (三线合一)}$$

$$= \frac{1}{2} AE$$


$$= 1$$

例题. 【答案】A. 解析: $\because CD$ 平分 $\angle ACB$, $BE \perp CD$, $\therefore BC = CE$, 又 $\because \angle A = \angle ABE$, $\therefore AE = BE$, $\therefore BD = \frac{1}{2}BE = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}(AC - BC)$, $\because AC = 5$, $BC = 3$, $\therefore BD = \frac{1}{2} \times (5 - 3) = 1$.

故选 A.

考点·直角三角形

1. 直角三角形性质



(1) 角的关系: $\angle A + \angle B = 90^\circ$.

(2) 边的关系: $a^2 + b^2 = c^2$ (勾股定理).

(3) 边角关系: $\left. \begin{matrix} \angle C = 90^\circ \\ \angle A = 30^\circ \end{matrix} \right\} \Rightarrow BC = \frac{1}{2}AB$ (直角三角形中, 30° 角所对的直角边等于斜边的一

半) (另外还有三角函数关系).

(4) $\left. \begin{matrix} \angle C = 90^\circ \\ AE = BE \end{matrix} \right\} \Rightarrow CE = \frac{1}{2}AB$ (直角三角形斜边上的中线 CE 等于斜边 AB 的一半).

c, h, a, b
知三求一 (利用面积)

(5) $ch = ab = 2S$ (如图, S 是 $Rt\triangle ABC$ 的面积, h 是斜边上的高).

(6) 外接圆半径 $R = \frac{c}{2}$; 内切圆半径 $r = \frac{a+b-c}{2}$.



2. 直角三角形的判定


(1) 有一个角等于 90° 的三角形是直角三角形.

(2) 有两角互余的三角形是直角三角形.

(3) 如果三角形一边上的中线等于这边的一半, 则该三角形是直角三角形.

(4) 勾股定理的逆定理: 如果三角形一条边的平方等于另外两条边的平方和, 那么这个三角形是直角三角形.

例题 1. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, BE 平分 $\angle ABC$, ED 垂直平分 AB 于 D , 若 $AC = 9$, 则 AE 的值是 ().



- A. $6\sqrt{3}$
C. 6


30° 角所对直角边是斜边的一半.

B. $4\sqrt{3}$

角平分线上的点到角两边距离相等.

例题 1. 【答案】C. 解析: 因为 BE 平分 $\angle ABC$, 所以 $DE = CE$, $\angle CBE = \angle DBE$, 因为 ED 垂直平分 AB 于 D , 所以 $\angle DBE = \angle A$, 所以 $\angle CBE = \angle DBE = \angle A$, 又 $\angle C = 90^\circ$, 所以 $\angle A = 30^\circ$, 则在直角三角形 ADE 中, 有 $AE = 2DE = 2CE$, 又 $AC = 9$, 所以 $AE = 6$.

例题 2. 如图, 小阳发现电线杆 AB 的影子落在土坡的坡面 CD 和地面 BC 上, 量得 $CD = 8$ 米, $BC = 20$ 米, CD 与地面成 30° 角, 且此时测得 1 米杆的影长为 2 米, 则电线杆的高度为




例题 2. 【答案】 $14+2\sqrt{3}$. 解析：如图做辅助线： $DE = DC \sin 30^\circ = 4$, $CE = 4\sqrt{3}$,

$\therefore \triangle DEF \sim \triangle ABF$, 所以可以得到 $\frac{DE}{AB} = \frac{EF}{BF}$, $\frac{AB}{BF} = \frac{1}{2}$, 联立解得 $AB = 14 + 2\sqrt{3}$.

考点·三角形全等的判定

- ① 已知两边, 通常再找一边或一角. “SAS”.
- ② 已知两角, 通常再找一边. “ASA”.
1. 边角边定理：有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等（可简写成“边角边”或“SAS”）.
 2. 角边角定理：有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等（可简写成“角边角”或“ASA”）.
 3. 角角边定理：有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等（可简写成“角角边”或“AAS”）.
 4. 边边边定理：有三边对应相等的两个三角形全等（可简写成“边边边”或“SSS”）.
 5. 斜边、直角边定理：有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等（可简写成“斜边、直角边”或“HL”）.

例题 1. 如图, $AB \parallel EF$, $AB = EF$, 添加下面哪个条件不能使 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$ ().



- A. $BD = FC$ B. $\angle A = \angle E$
C. $AC \parallel DE$ D. $AC = ED$

例题 1. 【答案】 D. 解析： $\because AB \parallel EF$, $\therefore \angle B = \angle F$, 且 $AB = EF$,

当 $BD = CF$ 时, 可得 $BC = DF$, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFD$ 中, 满足 SAS, 故 A 可以判定;

当 $\angle A = \angle E$ 时, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFD$ 中, 满足 ASA, 故 B 可以判定;

当 $AC \parallel DE$ 时, 可得 $\angle ACB = \angle EDF$, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFD$ 中, 满足 AAS, 故 C 可以判定;

当 $AC = DE$ 时, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFD$ 中, 满足 SSA, 故 D 不可以判定, 故选 D.

例题 2. 如图 $OA \perp OB$, $\triangle CDE$ 是等腰直角三角形, 点 C、D 分别在 OB、OA 上,

$\angle CED = 90^\circ$, 将 $\triangle CDE$ 绕点 C 顺时针旋转 75° , 点 E 的对应点 M 恰好落在 OB 上, 则 $\frac{OD}{CM}$ 值为 ().



B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

c. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$$OD = \sin 60^\circ \times CD = \frac{\sqrt{3}}{2} CD, \therefore \frac{OD}{CM} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} CD}{\frac{\sqrt{2}}{2} CD} = \frac{\sqrt{6}}{2}. \text{ 故选 B.}$$

$$\frac{4}{x+2} = \frac{2}{4} \quad x=6$$

$$\triangle ABD \sim \triangle CB$$

→ 相似三角形, 证明定理

'AAA', 'SSS', 'SAS', 'ASA', 'AAS', 'HL'

⇒ 思路: 已知两边成比例 ⇒ ① 找第三边 'SSS'
② 找两夹角 'SAS'

例题3. 【答案】6. 解析: $\because \angle DBA = \angle C$, $\angle A$ 是公共角, $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADB$, $\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AC}$,
即 $\frac{2}{4} = \frac{4}{AC}$, 解得: $AC = 8$, $\therefore CD = 8 - 2 = 6$. 故答案为: 6.

③ 找角平分线 HL 成立

垂直平分线性质


①垂足平分线上的点到线段的两个端点距离相等

② 梯形中垂线的交点 $\Rightarrow$ 梯形的中心

例题 4. 【答案】 68° . 解析: $\because AC$ 的垂直平分线分别交 AC, CD 于点 E, F , $\therefore \angle C = \angle CAF = 56^\circ$, 又 $\because AB \parallel CD$, $\therefore \angle CAB = 180^\circ - \angle C = 124^\circ$, $\therefore \angle BAF = \angle CAB - \angle CAF = 68^\circ$.

例题 5. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中 $\angle C=90^\circ$, $AC=6$, $BC=8$, 动点 P 由起点 A 沿边 AB 向终点 B 运动, 每秒两个单位, 动点 Q 由起点 B 沿边 BC 向终点 C 运动, 每秒一个单位, P、Q 两点同时由起点开始运动, 记运动时间为 t 秒.

- (1) 设 $\triangle BPQ$ 的面积为 S ，求 S 的最大值；
 (2) 当 $\triangle BPQ$ 与 $\triangle ABC$ 相似时，求 t 的值。



例题 5. 【答案】 (1) $\frac{15}{4}$; (2) $\frac{25}{7}, \frac{40}{13}$.

解析: (1) 作 QD 垂直于 BP 交 BP 于 D . $\sin B = \frac{AC}{AB} = \frac{6}{10} = \frac{QD}{BQ} = \frac{QD}{t}$, 解得 $QD = \frac{3}{5}t$, 因为 $AP = 2t, AB = 10$, 所以 $BP = 10 - 2t$; $s = \frac{1}{2} \times (10 - 2t) \times \frac{3}{5}t = 3t - \frac{3}{5}t^2$, 当 $t = \frac{5}{2}$ 时 S 取得最大值, 最大值为 $\frac{15}{4}$.

(2) 因为 $\triangle BPQ \sim \triangle ABC$, 所以 $\frac{BQ}{AB} = \frac{BP}{BC}$, $\frac{t}{10} = \frac{10 - 2t}{8}$, 解得 $t = \frac{25}{7}$. 因为 $\triangle PQB \sim \triangle ABC$, 所以 $\frac{BQ}{BC} = \frac{BP}{AB}$, $\frac{t}{8} = \frac{10 - 2t}{10}$, 解得 $t = \frac{40}{13}$.

考点·平行四边形

1. 平行四边形

(1) 性质

- ① 平行四边形对边平行且相等, 对角相等; 邻角互补; 对角线互相平分.
 ② 平行四边形 两个邻角的平分线互相垂直, 邻边不相等的平行四边形的两个对角的平分线互相平行.

(2) 判定

- ① 定义法: 两组对边分别平行的四边形是平行四边形.
 ② 边: 两组对边分别相等的四边形是平行四边形; 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

③ 角: 两组对角分别相等的四边形是平行四边形.

④ 对角线: 对角线互相平分的四边形是平行四边形.

2. 矩形

(1) 性质

- ① 矩形的四个角都是直角.
 ② 矩形的 对角线相等.
 ③ 矩形具有平行四边形的 所有性质.

(2) 判定


- ① 有三个角是直角的四边形是矩形.
 ② 对角线相等的平行四边形是矩形.

3. 菱形

(1) 性质

- ① 菱形的四条边都相等.

平行四边形判定条件
 { 一组对边平行且相等的四边形
 两组对边分别平行的四边形
 对角相等(两组)的四边形



AP 平分 $\angle A$; BP 平分 $\angle B$

$$\frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$$

$$\therefore \angle P = 90^\circ$$

对角线相等的平行四边形不一定是矩形. 例如: 菱形

菱形 $\rightarrow$ 正方形
 矩形 $\rightarrow$ 正方形
 正方形 $\rightarrow$ 正方形

②菱形的对角线互相垂直且平分，并且每一条对角线平分一组对角。

③菱形具有平行四边形的所有性质。

(2) 判定

①对角线互相垂直的平行四边形是菱形。

②四条边都相等的四边形是菱形。

4. 正方形

(1) 性质

①正方形的四条边都相等，四个角都是直角。

②正方形的对角线相等，且互相垂直平分；每条对角线平分一组对角。

③正方形是轴对称图形，两条对角线所在直线，以及过每一组对边中点的直线都是它的对称轴；正方形是中心对称图形，对角线的交点是它的对称中心。

(2) 判定

①一组邻边相等并且有一个角是直角的平行四边形是正方形。

②一组邻边相等的矩形是正方形。

③对角线互相垂直的矩形是正方形。


④有一个角是直角的菱形是正方形。

⑤对角线相等的菱形是正方形。

菱形的对角线互相垂直，分成4个全等的直角三角形。
直角便于后面的推导，找角的问题。

正方形：拥有平行四边形、矩形、菱形所有性质
拥有...所有特点

例题 1. 如图，在矩形 ABCD 中， $AB=6$ ， $AD=8$ ，P 是 AD 上一动点， $PE \perp AC$ 于 E， $PF \perp BD$ 于 F，则 $PE+PF$ 的值为 ()。




A. 5

B. 4.8

C. 4.4

D. 4

例题 1. 【答案】B. 解析：如图，过点 A 作 $AG \perp BD$ 于 G，连接 PO，



$\because AB=6$ ， $AD=8$ ， $\therefore BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=10$ ， $\therefore S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}BD \cdot AG=\frac{1}{2}AB \cdot AD$ ，

即 $\frac{1}{2} \times 10 \cdot AG = \frac{1}{2} \times 6 \times 8$ ，解得 $AG=4.8$ ，在矩形 ABCD 中， $AO=OD$ ，

$\therefore S_{\triangle AOD}=\frac{1}{2}AO \cdot PE+\frac{1}{2}OD \cdot PF=\frac{1}{2}OD \cdot AG$ ， $\therefore PE+PF=AG=4.8$ 。故选 B.

例题 2. 如图，平行四边形 ABCD 中，AC 与 BD 相交于点 O， $AB=AC$ ，延长 BC 到点 E，使 $CE=BC$ ，连接 AE，分别交 BD、CD 于点 F、G。


(1) 求证： $\triangle ADB \cong \triangle CEA$ ；

(2) 若 $BD=6$ ，求 AF 的长。

全等证明：SSS, SAS, ASA, AAS, HL

无ASA X

根据条件找信



本题可以用HL做 作高找垂。

例题 2. 【答案】(1) 见解析; (2) 2.

解析: (1) $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形, $\therefore AD=BC$, $\angle ABC+\angle BAD=180^\circ$.

又 $\because AB=AC$, $\therefore \angle ABC=\angle ACB$.

$\therefore \angle ACB+\angle ACE=180^\circ$, $\therefore \angle BAD=\angle ACE$.

$\because CE=BC$, $\therefore CE=AD$, $\therefore \triangle ADB \cong \triangle CEA$ (SAS).

(2) $\because \triangle ADB \cong \triangle CEA$, $\therefore AE=BD=6$.


$\because AD \parallel BC$, $\therefore \triangle ADF \sim \triangle EBF$. $\therefore \frac{AF}{EF} = \frac{AD}{BE} = \frac{1}{2}$. $\therefore \frac{AF}{AE} = \frac{1}{3}$. $\therefore AF=2$.

相似用对应线段成比例。

例题 3. 如图, 正方形纸片 ABCD, 边长 2, 其中 E 为 AB 中点, 点 F 是 BC、CD 两边上任一点, 沿直线 EF 折叠得 $\triangle MEF$, 点 B 的对应点 M 点, 分别连接 AM、DM

(1) 当点 F 位于 BC 边什么位置时, $\triangle AMD$ 为直角三角形;


(2) 若点 F 在 BC 边上, 且 $\triangle BFM$ 为等边三角形时, 连接 DF, 求 $\triangle DCF$ 的面积;



动点问题 多找定点或定点作辅助。

例题 3. 【答案】(1) BC 中点; (2) $2-\sqrt{3}$.

解析: (1) 如图, 取 AD 的中点 N, 连接 MN



找等边三角形思路

① 找等角证 60°

② 找三边相等

③ 找另一个等边, 此等边与已知相似

因为 $\triangle AMD$ 为直角三角形, 所以 $MN = \frac{1}{2}AD$

又因为四边形 ABCD 是正方形, E 是 AB 的中点


所以 $AE=EM=AN=MN$, 且 $\angle EAD=90^\circ$

所以四边形 AEMN 为正方形, 所以 EM 平行且等于 AN, 从而得 $EM \parallel BF$

又 $\angle B = \angle EMF = 90^\circ$ 故四边形 NEMF 为正方形, 所以 $BF = BE = \frac{1}{2}BC$

即 F 为 BC 的中点时, $\triangle AMD$ 为直角三角形.

(2) 如下图



$\because \triangle BFM$ 为等边三角形且 $\angle EMF = 90^\circ$

$\therefore \angle BME = 30^\circ$

又 $\triangle EMF$ 是 $\triangle EBF$ 沿 EF 翻折所得, 故 $EM=EB$, EF 与 BM 的交点 O 为 BM 的中点

所以 $EO \perp BM$, 又知 $EM=1$, $\therefore OM = EM \cdot \cos 30^\circ = 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore BF = BM = 2OM = \sqrt{3}$, $\therefore CF = BC - BF = 2 - \sqrt{3}$

$\therefore S_{\triangle CDF} = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot CF = \frac{1}{2} \times 2 \times (2 - \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$

翻折的性质

考点·圆

1. 在同圆或等圆中, 圆心角、圆心角对的弧、弦、弦心距有一组相等则其他几组对应相等.

2. 垂径定理: 垂直于弦的直径平分这条弦, 并且平分弦所对的弧. 常结合勾股定理考查, 构造直角三角形, 可解决计算弦长、半径、弦心距等问题.

推论: 平分弦 (不是直径) 的直径垂直于弦, 并且平分弦所对的两条弧.

3. 一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半.

半圆 (或直径) 所对的圆周角是直角, 90° 的圆周角所对的弦是直径.


4. 切线的性质: 圆的切线垂直于过切点的半径.

切线的判定: 经过半径的外端, 并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.

常用方法: 1. 连半径, 证垂直; 2. 作垂直, 证半径.

常用方程思想, 解用代数方法解决几何问题.

例题 1. 如图, $\widehat{AD}$ 是以等边三角形 ABC 一边 AB 为半径的四分之一圆周, P 为 $\widehat{AD}$ 上任意一点, 若 $AC=5$, 则四边形 $ACBP$ 周长的最大值是 ().



A. 15

B. 20

C. $15+5\sqrt{2}$

D. $15+5\sqrt{5}$


例题 1. 【答案】C. 解析: 考查四边形周长的计算, 四边形 $ACBP$ 周长最大时为点 P 与点 D 重合时, 点 P 与点 D 重合时四边形 $ACBP$ 的周长为: $AC+BC+BD+AD=5+5+5+5\sqrt{2}=15+5\sqrt{2}$, 故应选 C.

例题 2. 一条弦 AB 将 $\odot O$ 分成两条弧, 其中一条弧是另一条弧的 4 倍, 则弦 AB 所对的圆心角的度数是 _____ 度.

例题 2. 【答案】72. 解析: 由于弦 AB 将 $\odot O$ 分成了 1:4 两段弧, $\therefore AB$ 所对的圆心角

$\angle AOB = \frac{1}{5} \times 360^\circ = 72^\circ$. 故答案为 72.


例题 3. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 E. 若 $AB=8$, $AE=1$, 则弦 CD 的长是



构造直角三角形

例题 3. 【答案】 $2\sqrt{7}$. 解析: 由题意连接 OC, 得 $OE = OB - AE = 4 - 1 = 3$,


$CE = CD = \sqrt{OC^2 - OE^2} = \sqrt{7}$, $CD = 2CE = 2\sqrt{7}$.



例题 4. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 点 D 在 AB 上, 以 AD 为直径的 $\odot O$ 与 BC 相交于点 E, 且 AE 平分 $\angle BAC$.

(1) 求证: BC 是 $\odot O$ 的切线;


(2) 若 $\angle EAB=30^\circ$, $OD=3$, 求图中阴影部分的面积.



求阴影面积方法: ① 直接用公式法;
② 和差法;
③ 割补法 (转化)

例题 4. 【答案】 (1) 证明见解析; (2) $\frac{9\sqrt{3}}{2} - \frac{3\pi}{2}$.

解析: (1) 证明: 连接 OE, 用法 1.



$\because AE$ 平分 $\angle BAC$, $\therefore \angle CAE = \angle EAD$,

$\because OA = OE$, $\therefore \angle EAD = \angle OEA$, $\therefore \angle OEA = \angle CAE$, $\therefore OE \parallel AC$, $\therefore \angle OEB = \angle C = 90^\circ$,

$\therefore OE \perp BC$, 且点 E 在 $\odot O$ 上, $\therefore BC$ 是 $\odot O$ 的切线.

连半径, 证垂直

(2) $\because \angle EAB = 30^\circ$, $\therefore \angle EOD = 60^\circ$,


$\because \angle OEB = 90^\circ$, $\therefore \angle B = 30^\circ$, $\therefore OB = 2OE = 2OD = 6$, $\therefore BE = \sqrt{OB^2 - OE^2} = 3\sqrt{3}$,

$$S_{\text{阴影}} = \frac{n\pi R^2}{360} = \frac{1}{2}LR$$

$$S_{\triangle OEB} = \frac{9\sqrt{3}}{2}, \text{ 扇形 } OED \text{ 的面积} = \frac{3}{2}\pi. \text{ 阴影部分的面积为: } \frac{9\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}\pi.$$


例题 5. 已知: 如图, M 是弧 AB 的中点, 过点 M 的弦 MN 交弦 AB 于点 C, 设 $\odot O$ 的半径为 4cm, $MN = 4\sqrt{3}\text{cm}$.

- (1) 求圆心 O 到弦 MN 的距离;
- (2) 猜想 OM 和 AB 的位置关系, 并说明理由;
- (3) 求 $\angle ACM$ 的度数.



例题 5. 【答案】(1) 圆心 O 到弦 MN 的距离为 2cm; (2) $OM \perp AB$, 理由见解析; (3) $\angle ACM = 60^\circ$.

解析: (1) 连接 OM,



$\because$ 点 M 是弧 AB 的中点, $\therefore OM \perp AB$, 过点 O 作 $OD \perp MN$ 于点 D, 由垂径定理,

得 $MD = \frac{1}{2}MN = 2\sqrt{3}$. 在 $\text{Rt}\triangle ODM$ 中, $OM = 4$, $MD = 2\sqrt{3}$, $\therefore OD = \sqrt{OM^2 - MD^2} = 2$,

故圆心 O 到弦 MN 的距离为 2cm.


(2) 猜想: $OM \perp AB$,

连接 OA、OB, 由 M 是弧 AB 的中点, 得 $\angle AOM = \angle BOM$, 又因为 $OA = OB$, 所以 $OM \perp AB$.

(3) $\cos \angle OMD = \frac{MD}{OM} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \angle OMD = 30^\circ$, $\because OM \perp AB$, $\therefore \angle ACM = 60^\circ$.

考点·三角函数

1. 锐角三角函数的定义



$$\sin A = \frac{a}{c}; \cos A = \frac{b}{c}; \tan A = \frac{a}{b}.$$

正弦: $\frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$

余弦: $\frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$

正切: $\frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$

2. 同角或互余两角的三角函数关系

(1) 互余两角之间的三角函数关系: $\sin A = \cos B$.

常用关系

(2) 同角之间的三角函数关系: $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$; $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$.

3. 锐角三角函数的大小比较

(1) 正弦、正切是增函数, 三角函数值随角的增大而增大.

(2) 余弦、余切是减函数, 三角函数值随角的增大而减小.

4. 特殊角的三角函数值

三角函数 \ 角	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在
$\cot \alpha$	不存在	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

结合图形记忆特殊角的三角函数值

5. 解直角三角形

解决这类问题的关键是以边角关系和勾股定理为主.

(1) 边的关系 (勾股定理): $AC^2 + BC^2 = AB^2$.

(2) 角的关系: $\angle A + \angle B = \angle C = 90^\circ$.

(3) 边角关系: 锐角三角函数关系.

构造直角三角形, 应用锐角三角函数解题


例题. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 如果 $AB = 2$, $BC = 1$, 那么 $\sin A$ 的值是 ().

A. $\frac{1}{2}$


B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$



例题. 【答案】A. 解析: 由题意得: $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{2}$. 故选 A.



考点·视图

1. 视图

主视图: 从正面看到的图; 左视图: 从左面看到的图; 俯视图: 从上面看到的图.

2. 画三视图的原则

长对正, 高平齐, 宽相等; 在画图时, 看得见部分的轮廓线通常画成实线, 看不见的轮廓线通常画成虚线.


主视图与俯视图的长要相等,
左视图与俯视图的宽要相等.

故表面积 $= \pi rl + \pi r^2 = \pi \times 2 \times 6 + \pi \times 2^2 = 16\pi$. 故选 A.

考点·常见统计图的特点

名称	特点
条形图	能清楚地表示每个项目的具体数据
扇形图	能直观地反映部分占总体的百分比
折线图	能清楚地反映数据的变化趋势
直方图	能直观、清楚地反映数据在各小组的分布情况

例题 1. 某校 40 名学生参加科普知识竞赛（竞赛分数都是整数），竞赛成绩的频数分布直方图如图所示，成绩的中位数落在（ ）.



A. 50.5~60.5 分


B. 60.5~70.5 分

C. 70.5~80.5 分

D. 80.5~90.5 分

例题 1. 【答案】C. 解析：由频数分布直方图知，这组数据共有 $3+6+8+8+9+6=40$ 个，则其中位数为第 20、21 个数据的平均数，而第 20、21 个数据均落在 70.5~80.5 分这一分组内，所以中位数落在 70.5~80.5 分。故选 C.

例题 2. 如图是根据某初中为地震灾区捐款的情况而制作的统计图，已知该校在校学生有 200 人，请根据统计图计算该校共捐款_____元.



例题 2. 【答案】2518. 解析：根据题意得：初一学生捐款的钱数 $200 \times 32\% \times 15 = 960$ 元，初二学生捐款的钱数 $200 \times 33\% \times 13 = 858$ 元，初三学生捐款的钱数 $200 \times 35\% \times 10 = 700$ 元，所以该校学生共捐款 $960 + 858 + 700 = 2518$ 元.

考点·概率

1. 事件的分类

事件 $\begin{cases} \text{确定事件} \begin{cases} \text{必然事件: } P=1 \\ \text{不可能事件: } P=0 \end{cases} \\ \text{不确定事件(随机事件): } 0 < P < 1 \end{cases}$

2. 概率的计算方法

(1) 利用概率的定义直接计算

一般地,如果在一次试验中,有 n 种可能的结果,并且它们发生的可能性都相等,事件 A 包含其中的 m 种结果,那么事件 A 发生的概率为: $P(A) = \frac{m}{n}$.

(2) 树形图法.

(3) 列表法.

用来求事件概率的方法.

(4) 用频率估计概率(在大量重复试验中,事件 A 发生的频率为 $\frac{m}{n}$, 我们可以估计事件 A 发生的概率为 $\frac{m}{n}$).

3. 用面积法求概率: 当随机事件的概率大小与几何图形的面积有时, 往往利用面积法求概率, 计算公式为: $P(A) = \frac{\text{事件}A\text{发生的面积}}{\text{总面积}}$.

4. 当一次试验要涉及 1 个因素时, 通常采用枚举法求事件的概率; 当一次试验涉及 2 个因素时, 可用列表法或画树状图法求概率; 当一次试验涉及 3 个或 3 个以上的因素时, 必须用画树状图法求概率.

5. 用试验估算某事件发生的概率: 某事件发生的概率 = $\frac{\text{此事件出现的次数}}{\text{实验的总次数}}$.

例题 1. 在一次“爱心互助”捐款活动中, 某班第一小组 7 名同学捐款的金额(单位: 元)分别为 6, 3, 6, 5, 5, 6, 9 这组数据的中位数和众数分别是 ().

A. 5, 5

B. 6, 6

C. 6, 5

D. 5, 6

例题 1. 【答案】B. 解析: 将这一组数按照从高到低的顺序排列, 得 3、5、5、6、6、6、9, 则其中位数为 6; 这组数中出现次数最多的数是 6, 即为众数, 故答案为 B.

例题 2. 下列算式: ① $\sqrt{9} = \pm 3$; ② $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$; ③ $2^6 \div 2^3 = 8$; ④ $\sqrt{8} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$; ⑤ $a + a = a^2$ 运算结果正确的概率是 . ① $\sqrt{9} = \pm 3$, 容易出错, 很多人对于 9 的正负平方根

例题 2. 【答案】 $\frac{3}{5}$. 解析: 只有②③④正确, 故正确的概率为 $\frac{3}{5}$. 正数 概念理解不清, 9 是算术平方根即 3, $-\sqrt{9} = -3$.

例题 3. 一枚质地均匀的骰子, 其中六个面上分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 投掷一次, 朝上一面的数字是奇数的概率为 .

例题 3. 【答案】 $\frac{1}{2}$. 解析: 一枚质地均匀的骰子, 其六个面分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5,

6, 投掷一次, 朝上一面是奇数的概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.


例题 4. 从 -1, 2, 3, -6 这四个数中任选两数, 分别记作 m, n , 那么点 (m, n) 在函数 $y = \frac{6}{x}$ 图象上的概率是 .

例题 4. 【答案】 $\frac{1}{3}$. 解析: $\because$ 共有 12 种等可能的结果, 点 (m, n) 恰好在反比例函数 $y = \frac{6}{x}$

图象上的有: (2, 3), (-1, -6), (3, 2), (-6, -1), $\therefore$ 点 (m, n) 在函数 $y = \frac{6}{x}$ 图象上的概

率是: $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. 故答案为: $\frac{1}{3}$. 此题运用高中排列组合知识更简单 $\frac{2}{C_4^2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

例题 5. 九(1)班同学分成甲、乙两组,开展“四个城市建设”知识竞赛,满分得 5 分,得分均为整数.小马虎根据竞赛成绩,绘制了如图所示的统计图.经确认,扇形统计图是正确的,条形统计图也只有乙组成绩统计有一处错误.



(1) 指出条形统计图中存在的错误,并求出正确值;

(2) 若成绩达到 3 分及以上为合格,该校九年级有 800 名学生,请估计成绩未达到合格的有多少名?

(3) 九(1)班张明、李刚两位成绩优秀的同学被选中参加市里组织的“四个城市建设”知识竞赛.预赛分为 A、B、C、D 四组进行,选手由抽签确定.张明、李刚两名同学恰好在同一组的概率是多少?

例题 5. 【答案】(1) 见解析; (2) 140 人; (3) $\frac{1}{4}$.

解析: (1) 由统计图可得:

	(1 分)	(2 分)	(3 分)	(4 分)	(5 分)
甲 (人)	0	3	7	6	4
乙 (人)	2	2	5	8	4
全体 (%)	5	12.5	30	35	17.5

乙组得分的人数统计有误,理由:由条形统计图和扇形统计图的对应可得,


$$2 \div 5\% = 40, (3+2) \div 12.5\% = 40,$$

$$(7+5) \div 30\% = 40, (6+8) \div 35\% = 40, (4+4) \div 17.5\% \neq 40,$$

故乙组得 5 分的人数统计有误,正确人数应为: $40 \times 17.5\% - 4 = 3$.

$$(2) 800 \times (5\% + 12.5\%) = 140 \text{ (人)};$$


(3) 如图得:



∴ 共有 16 种等可能的结果,所选两人正好分在一组的有 4 种情况,

$$\therefore \text{所选两人正好分在一组的概率是: } \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

例题 6. 某电视台为了解本地区电视节目的收视情况，对部分观众开展了你最喜爱的“电视节目”的问卷调查，每人只填写一项，根据收集的数据绘制下面两幅不完整的统计图，请你按要求回答下面问题



(1) 本次问卷调查共调查了 () 名观众

(2) 图二中最喜爱的“新闻节目”的人数占调查总人数百分比为 ()，“综艺节目”在扇形统计图中所相应的圆心角度数为 ()。

(3) 补充图一的条形统计图。


(4) 现有最喜爱“新闻节目”记为 A，“体育节目”记为“B”，“综艺节目”记为 C，“科普节目”记为 D 的观众各一名，电视台要从四人中随机抽取两人参加联谊活动，请用列表或画树状图的方法，求出抽到最喜爱“B”和“C”两位观众的概率。

例题 6. 【答案】(1) 200；(2) 25%，63°；(3) 见图；(4) $\frac{1}{6}$ 。

解析：(1) $\frac{45}{22.5\%} = 200$ 人；

(2) 最喜爱的“新闻节目”的人数占调查总人数百分比为 $\frac{50}{200} = 25\%$ ，“综艺节目”在扇形统计图中所相应的圆心角度数为 $\frac{35}{200} \times 360^\circ = 63^\circ$ ；

(3) 见图；



(4) 如图；总共有 12 中可能，其中同时抽到喜爱 B，C 两类节目的可能有两种，所以抽到最喜爱“B”和“C”两位观众的概率为 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ ，



第三节 高中数学(上篇)

考点·集合

1. 集合的运算

(1) 交集: $A \cap B = \{x | x \in A, \text{ 且 } x \in B\}$.

(2) 并集: $A \cup B = \{x | x \in A, \text{ 或 } x \in B\}$.

(3) 补集: $\complement_U A = \{x | x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$.

2. 集合的运算性质

(1) 并集的性质: $A \cup \emptyset = A$; $A \cup A = A$; $A \cup B = B \cup A$; $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$.

(2) 交集的性质: $A \cap \emptyset = \emptyset$; $A \cap A = A$; $A \cap B = B \cap A$; $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$.

(3) 补集的性质: $A \cup (\complement_U A) = U$; $A \cap (\complement_U A) = \emptyset$; $\complement_U (\complement_U A) = A$.

(4) 摩根定律: $\complement_U (A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$; $\complement_U (A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$.

并的补等于补的交 交的补等于补的并

例题 1. 设集合 $A = \{x | y = \lg(-x^2 + x + 2)\}$, $B = \{x | x - a > 0\}$, 若 $A \subseteq B$ 则实数 a 的取值范围 ().

A. $(-\infty, -1)$

B. $(-\infty, -1]$

C. $(-\infty, -2)$

D. $(-\infty, -2]$

例题 1. 【答案】B. 解析: 由题可知 $A = (-1, 2)$, $B = (a, +\infty)$, $A \subseteq B$, 则 $-1 \geq a$, 即 $(-\infty, -1]$.

例题 2. 已知集合 $A = \{y | y = \log_2 x (x > 2)\}$, $B = \{y | y = \left(\frac{1}{2}\right)^x (x < 1)\}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A \cap B = ()$.

A. $\{y | 0 < y < \frac{1}{2}\}$

B. $\{y | 0 < y < 1\}$

C. $\{y | \frac{1}{2} < y \leq 1\}$

D. $\emptyset$

例题 2. 【答案】C. 解析: 集合 $A = \{y | y = \log_2 x (x > 2)\} = \{y | y > 1\}$, $B = \{y | y > \frac{1}{2}\}$, 则

$$\complement_{\mathbb{R}} A \cap B = \{y | y \leq 1\} \cap \{y | y > \frac{1}{2}\} = \{y | \frac{1}{2} < y \leq 1\}.$$

例题 3. 已知集合 $A = \{x | x^2 + 2x - 3 < 0\}$, $B = \{x | 2 + 3x > -4\}$, 则 $A \cap B = ()$.

A. $\{x | -1 < x < 1\}$

B. $\{x | -2 < x < 1\}$

C. $\{x | -\frac{2}{3} < x < 1\}$

D. $\{x | -3 < x < -2\}$

例题 3. 【答案】B. 解析: 因为 $A = \{x | x^2 + 2x - 3 < 0\} = \{x | -3 < x < 1\}$, $B = \{x | 2 + 3x > -4\} = \{x | x > -2\}$, 所以 $A \cap B = \{x | -2 < x < 1\}$, 故选 B.

例题 4. 已知集合 $P = \{x | x^2 - 2x \geq 0\}$, $Q = \{x | 1 < x \leq 2\}$, 则 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q =$ _____.

例题 4. 【答案】(1, 2). 解析: P 解集为 $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$, 补集为 $(0, 2)$, $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q = (1, 2)$.

例题 5. 集合 $A = \{x | x^2 - 16 < 0\}$, 集合 $B = \{x | x = 2t, t \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

例题 5. 【答案】 $\{-2, 0, 2\}$. 解析: 由 A 集合解得 $-4 < x < 4$, 由 B 集合可知 x 能被 2 整除, 联立可得 $\{-2, 0, 2\}$.

例题 6. 设集合 $A = \{x | x > 1\}$, 集合 $B = \{a + 2\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.


例题 6. 【答案】 $(-\infty, -1]$. 解析: 根据交集的性质, 说明 $a + 2$ 不是集合 A 里的元素, 可知 $a + 2 \leq 1$, 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, -1]$.

例题 7. 已知集合 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0, 2\}$, 则 $C_U A =$ _____.

例题 7. 【答案】 $\{1, 3\}$. 解析: 在全集为 U 的情况下, A 的补集是 $\{1, 3\}$.

考点·简易逻辑

1. 四种命题及相互关系



2. 四种命题的真假关系

- (1) 两个命题互为逆否命题, 它们有相同的真假性.
- (2) 两个命题互为逆命题或互为否命题, 它们的真假性没有关系.

3. 充分条件与必要条件

- (1) 如果 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.
- (2) 如果 $p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$, 则 p 是 q 的充要条件.

4. 简单复合命题的真值表

p	q	非 p	非 q	p 或 q	p 且 q
真	真	假	假	真	真
真	假	假	真	真	假
假	真	真	假	真	假
假	假	真	真	假	假

5. 命题的否定

- (1) 全称命题的否定是特称命题; 特称命题的否定是全称命题.
- (2) p 或 q 的否定: 非 p 且非 q ; p 且 q 的否定: 非 p 或非 q .

例题 1. 已知 $p: \exists x_0 \in (-1, 0), x_0^{-2} < 2^{x_0}$, $q: \forall a \in (0, \infty)$, 函数 $y = |\tan ax|$ 最小正周期为 $\frac{\pi}{a}$, 则下列命题中为真命题的是 ().

A. $p \wedge q$

B. $p \wedge (\neg q)$

C. $p \vee q$

D. $p \vee (\neg q)$

例题 1. 【答案】C. 解析: 由题知, p 假, q 真, 且一假则假, 或一真则真, 可知 C 正确.

例题 2. “ $\sin x = \cos x + 1$ ”是“ $\tan \frac{x}{2} = 1$ ”的 ().

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

例题 2. 【答案】B. 解析: 当 $x = \pi$ 时, $\sin x = 0, \cos x = -1$, 满足 $\sin x = \cos x + 1$, 此时 $\tan \frac{x}{2}$

不存在, 则充分性不成立; 若 $\tan \frac{x}{2} = 1$, 则 $\frac{x}{2} = k\pi + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$, 据此可得: $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$,

此时 $\sin x = 1, \cos x = 0$, 满足 $\sin x = \cos x + 1$, 即必要性成立, 综上可得: “ $\sin x = \cos x + 1$ ”是“ $\tan \frac{x}{2} = 1$ ”

的必要不充分条件. 本题选择 B 选项.

例题 3. “ $x < 1$ ”是“ $3^x < 1$ ”的 ().

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

例题 3. 【答案】B. 解析: $0 < 1, 3^0 = 1, 3^x < 1 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow x < 1$. 故“ $x < 1$ ”是“ $3^x < 1$ ”的必要不充分条件, 选 B.

例题 4. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 则 “ $|\vec{a} - 3\vec{b}| = |3\vec{a} + \vec{b}|$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的 ().

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

例题 4. 【答案】C. 解析: 因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, $|\vec{a} - 3\vec{b}| = |3\vec{a} + \vec{b}| \Leftrightarrow |\vec{a} - 3\vec{b}|^2 = |3\vec{a} + \vec{b}|^2 \Leftrightarrow \vec{a}^2 + 9\vec{b}^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} = 9\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$, 所以 “ $|\vec{a} - 3\vec{b}| = |3\vec{a} + \vec{b}|$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的充分必要条件, 故选 C.

考点·函数的定义

设 A, B 是非空的数集, 如果按照某种确定的对应关系 f , 使对于集合 A 中的任意一个数 x , 在集合 B 中都有唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应, 那么就称 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 记作 $y = f(x), x \in A$.

A 中元素必取
B 中元素可余

A 到 B 可多对一, 不可一对多

例题 1. 给定映射 $f(x, y) \rightarrow (x + 2y, 2x - y)$, 在映射 f 的作用下 $(3, 1)$ 的原象为 ().

A. $(1, 3)$

B. $(1, 1)$

C. $(3, 1)$

D. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

例题 1. 【答案】B. 解析: 由题干条件可知 $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$.

例题 2. 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x-1)} + \sqrt{9-x}$ 的定义域为 ().

- A. (1, 9)
C. (1, 2) ∪ (2, 9)

- B. (1, 9]
D. (1, 2) ∪ (2, 9]

例题 2. 【答案】D. 解析：由函数得 $\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 \neq 1 \\ 9-x \geq 0 \end{cases}$ ，所以 $\begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \\ x \leq 9 \end{cases}$ ，所以定义域为 (1, 2) ∪ (2, 9]。

9]。

例题 3. 当 $x \in (0, 1)$ 时，函数 $y = \frac{x-1}{2x+1}$ 的值域是 ()。

- A. [1, 0) B. (-1, 0]
C. (-1, 0) D. [-1, 0]

例题 3. 【答案】C. 解析： $y = \frac{x-1}{2x+1} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2(2x+1)}$ ， $x \in (0, 1)$ ，则 $2(2x+1) \in (2, 6)$ ，则 $\frac{3}{2(2x+1)} \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ ，则 $y \in (-1, 0)$ 。

例题 4. 设 $f(x) = \begin{cases} 3^x, & x < 2 \\ \log_3 x, & x \geq 2 \end{cases}$ ，则 $f[f(3)]$ 的值_____。

例题 4. 【答案】3. 解析：由题可知， $f(3) = \log_3 3 = 1$ ， $f[f(3)] = f(1) = 3$ 。先求里层，再求外层。



例题 5. 函数 $y = \sqrt{3-x} + \arcsin \frac{3-2x}{5}$ 的定义域为_____。

例题 5. 【答案】 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$. 解析：由题意可知 $\begin{cases} 3-x \geq 0 \\ -1 \leq \frac{3-2x}{5} \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 3 \\ -1 \leq x \leq 4 \end{cases} \Rightarrow -1 \leq x \leq 3$ 。

由于正弦函数值域为 $[-1, 1]$

因此 $\arcsin x$ 的定义域为 $[-1, 1]$

考点·函数的单调性

	增函数	减函数
定义	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 I ， 如果对于定义域 I 内某个区间 D 上的任意两个自变量 x_1, x_2 ， 当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ， 那么就说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是增函数	当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ， 那么就说函数 $f(x)$ 在区间 D 上是减函数
图象描述	符号方向相同  自左向右看图象是上升的	符号方向相反  自左向右看图象是下降的

常用该定义证明增、减函数

例题 1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (3a-1)x+4a & x < 1 \\ \log_a x & x \geq 1 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数，那么 a 的取值范围是 ()。

- A. (0, 1)

- B. $(0, \frac{1}{3})$

C. $\left[\frac{1}{7}, \frac{1}{3}\right)$

D. $\left[\frac{1}{7}, 1\right)$

例题 1. 【答案】C. 解析：由题意由 $\begin{cases} 3a-1 < 0 \\ (3a-1)+4a \geq \log_a \frac{1}{3} \\ 0 < a < 1 \end{cases}$ ，即 $\begin{cases} a < \frac{1}{3} \\ a \geq \frac{1}{7} \\ 0 < a < 1 \end{cases}$ ，所以 $\frac{1}{7} \leq a < \frac{1}{3}$ 。

例题 2. 已知函数 $f(x)$ 在 R 上是增函数，设 $a = e^{\frac{1}{e}}$, $b = \ln \sqrt{2} - \frac{1}{3} \ln 3$, $c = \pi^{\frac{1}{\pi}}$ ，则下列不等式成立的是 ()。

A. $f(a) > f(b) > f(c)$

B. $f(c) > f(a) > f(b)$

C. $f(c) > f(b) > f(a)$

D. $f(a) > f(c) > f(b)$

例题 2. 【答案】D. 解析：令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ，当 $x \in (0, e)$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上为增函数，当 $x \in (e, +\infty)$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上为减函数，故 $\frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$ ，即 $\frac{1}{e^e} > \pi^{\frac{1}{\pi}}$ ，故 $a > c > 0$ ，又 $\ln \sqrt{2} - \frac{1}{3} \ln 3 = \frac{\ln 2}{2} - \frac{\ln 3}{3} = \frac{\ln 4}{4} - \frac{\ln 3}{3} < 0$ ， $\therefore a > c > b$ ，综上， $f(a) > f(c) > f(b)$ ，故选 D。

例题 3. 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 3)$ 的单调递减区间为 。

例题 3. 【答案】 $(-\infty, -1)$ 。解析：对数的真数大于 0，函数定义域为 $x \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ ；本题关键为复合函数的单调性遵循同增异减原则，对数函数为单调递增函数，真数部分为单调递减的部分为 $x \in (-\infty, -1)$ 。

例题 4. 已知函数 $f(x) = \frac{3x+1}{x+a}$ 的图象过点 $(1, -4)$ 。

(1) 若 $f(x^2) = 10$ ，求实数 x 的值；

(2) 当 $x \in [-5, 1]$ 时，求函数 $f(x)$ 的取值范围。

例题 4. 【答案】(1) $x = \pm\sqrt{3}$ ；(2) $[-4, 2]$ 。

解析：(1) $f(1) = \frac{4}{1+a} = -4$ ， $\therefore a = -2$ ，

$$f(x^2) = \frac{3x^2+1}{x^2-2} = 10, 3x^2+1 = 10x^2-20,$$

$$\therefore 7x^2 = 21, x^2 = 3, \therefore x = \pm\sqrt{3};$$

$$(2) f(x) = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{3(x-2)+7}{x-2} = 3 + \frac{7}{x-2},$$

显然 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 与 $(-\infty, 2)$ 上都是减函数,

$\because [-5, 1] \subseteq (-\infty, 2], \therefore f(x)$ 在 $[-5, 1]$ 上是减函数,

$$\because f(-5) = 3 + \frac{7}{-7} = 2, f(1) = 3 + \frac{7}{-1} = -4, \therefore f(x) \in [-4, 2].$$

例题 5. 设 $f(x) = \frac{1}{2}(x-5)^2 + a \ln x$, 其中 $a \in R$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 y 轴交于点 $(0, 6)$, 求 $f(x)$ 单调区间.

(2) 设 $f'(x)$ 是 $y=f(x)$ 的导函数, $g(x) = x-5+2e^{2x}$, 讨论 $g(x)=f'(x)$ 零点的个数.

例题 5. 【答案】(1) $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 和 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(2, 3)$ 上单调递减.

(2) 当 $a > 0$ 时, $g(x)=f'(x)$ 有一个零点, 当 $a \leq 0$ 时, $g(x)=f'(x)$ 没有零点.

解析: (1) 由已知得函数的定义域为 $(0, +\infty)$, $f(1)=8$, $f'(x)=x-5+\frac{a}{x}$, $f'(1)=a-4$,

则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-8=(a-4)(x-1)$, 代入 $(0, 6)$ 可解得 $a=6$. 所以 $f'(x)=x-5+\frac{6}{x}=\frac{(x-2)(x-3)}{x}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 和 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(2, 3)$ 上单调递减.

(2) $g(x)=f'(x)$ 即 $x-5+\frac{a}{x}=x-5+2e^{2x}$, 即 $a=2xe^{2x}$. 因为 $y=2xe^{2x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $2xe^{2x}|_{x=0}=0$, 所以当 $a > 0$ 时, $g(x)=f'(x)$ 有一个零点, 当 $a \leq 0$ 时, $g(x)=f'(x)$ 没有零点.

例题 6. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 + \frac{1}{2}a$ (a 为常数), $g(x) = \ln x - (a+1)x$.

(1) 求函数 $g(x)$ 的单调区间.

(2) 设 $F(x)=f(x)+g(x)$, 若函数 $F(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 的最小值为 -1 , 求实数 a 的取值范围.

例题 6. 【答案】(1) ① $a \leq -1$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上 $g(x)$ 单调递增. ② $a > -1$ 时, 在 $(0, \frac{1}{a+1})$ 上 $g(x)$ 单调递增; 在 $(\frac{1}{a+1}, +\infty)$ 上 $g(x)$ 单调递减. (2) $a \geq 1$.

解析: (1) $g'(x) = \frac{1}{x} - (a+1)$ ($x > 0$).

① 当 $a+1 \leq 0$, 即 $a \leq -1$ 时, 有在 $(0, +\infty)$ 上 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

② 当 $a+1 > 0$, 即 $a > -1$ 时, 有在 $(0, \frac{1}{a+1})$ 上 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 在 $(\frac{1}{a+1}, +\infty)$ 上 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

$$(2) F(x) = f(x) + g(x) = \ln x + \frac{1}{2}ax^2 - (a+1)x + \frac{1}{2}a,$$

$$F'(x) = \frac{1}{x} + ax - (a+1) = \frac{ax^2 - (a+1)x + 1}{x} = \frac{(x-1)(ax-1)}{x},$$

因为函数 $F(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 的最小值为 -1 且 $F(1) = -1$, 所以在 $[1, +\infty)$ 上 $ax-1 \geq 0$,
即在 $[1, +\infty)$ 上 $a \geq \frac{1}{x}$, 所以 $a \geq 1$. 找特殊值

考点·函数的奇偶性

(1) 奇、偶函数的概念

一般地, 如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 x , 都有 $f(-x) = f(x)$, 那么函数 $f(x)$ 就叫做偶函数. 关于y轴对称

一般地, 如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 x , 都有 $f(-x) = -f(x)$, 那么函数 $f(x)$ 就叫做奇函数. 关于原点对称

奇函数的图象关于原点对称; 偶函数的图象关于 y 轴对称.

(2) 奇、偶函数的性质

① 奇函数在关于原点对称的区间上的单调性相同, 偶函数在关于原点对称的区间上的单调性相反.

② 在公共定义域内, 两个奇函数的和是奇函数, 两个奇函数的积是偶函数; 两个偶函数的和、积都是偶函数; 一个奇函数, 一个偶函数的积是奇函数.

③ 复合函数的奇偶性可以概括为 “同奇则奇, 一偶则偶”.

例题 1. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \geq 0 \\ x^2 - 2x, & x < 0 \end{cases}$, 则满足 $f(2x+1) > f(2)$ 成立的 x 取值范围是 ().

A. $\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

B. $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

C. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

D. $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

例题 1. 【答案】B. 解析: 由题意, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \geq 0 \\ x^2 - 2x, & x < 0 \end{cases}$, 满足 $f(-x) = f(x)$, 所以

函数 $f(x)$ 为偶函数, 且当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 单调递增, 当 $x < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 单调递减, 又

$f(2x+1) > f(2)$, 所以 $|2x+1| > 2$, 解得 $x < -\frac{3}{2}$ 或 $x > \frac{1}{2}$, 故选 B.

例题 2. 已知 $f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \lg \frac{1+x}{1-x}$ 则 $f(x)$ 为 ().

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法确定

例题 2. 【答案】A. 解析: 由题意知 $f(-x) = \lg \frac{1-x}{1+x}$,

$$\underline{f(-x) + f(x)} = \lg \left(\frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{1+x}{1-x} \right) = \lg 1 = 0, \text{ 所以为奇函数.}$$

例题 3. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 和偶函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=a^x-a^{-x}+2$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$), 若 $g(2)=a$, 则 $f(2)=$ _____.

例题 3. 【答案】 $\frac{15}{4}$. 解析: $\because f(x)+g(x)=a^x-a^{-x}+2$, $g(2)=a$, $\therefore f(2)+g(2)=a^2-a^{-2}+2$
①, $\because f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数. $\therefore$ 当 $x=-2$ 时, $f(-2)+g(-2)=a^{-2}-a^2+2$ ②, 即
 $-f(2)+g(2)=a^{-2}-a^2+2$ ③, ①+③得: $2g(2)=4$, 即 $g(2)=2$, 又 $g(2)=a$, $\therefore a=2$. 代入①

得: $f(2)+2=2^2-2^{-2}+2$, $\therefore f(2)=2^2-2^{-2}=4-\frac{1}{4}=\frac{15}{4}$.

例题 4. 设函数 $f(x)=\frac{1}{2^x+1}+a$ 是奇函数, 则实数 a 的值为_____.

例题 4. 【答案】 $-\frac{1}{2}$. 解析: $\because$ 函数 $f(x)=\frac{1}{2^x+1}+a$ 是奇函数, $\therefore f(0)=\frac{1}{2^0+1}+a=0$, 则
 $a=-\frac{1}{2}$.

考点·函数的周期性

(1) 周期函数: 对于函数 $y=f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得当 x 取定义域内的任何
值时, 都有 $f(x+T)=f(x)$, 那么就称函数 $y=f(x)$ 为周期函数, 称 T 为这个函数的周期.

(2) 最小正周期: 如果在周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个最小的正数, 那么这个最小
正数就叫做 $f(x)$ 的最小正周期.

(3) 由周期函数的定义, 采用迭代法可得结论

① 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+a)=-f(x)$, 则 $f(x)$ 是周期为 $2a$ 的函数.

② 若 $f(x+a)=\pm\frac{1}{f(x)}$ ($a\neq 0$) 恒成立, 则 $T=2a$.

③ 若 $f(x+a)=f(x-a)$, 则 $T=2a$.

④ 若 $f(x+a)=-\frac{1-f(x)}{1+f(x)}$, 则 $T=4a$.

考点·函数的图象变换

(1) 平移变换: $y=f(x\pm a)$ ($a>0$) 的图象, 可由 $y=f(x)$ 的图象沿 x 轴方向向左或向右平移
 a 个单位得到; $y=f(x)\pm b$ ($b>0$) 的图象, 可由 $y=f(x)$ 的图象沿 y 轴方向向上或向下平移 b 个单
位得到. 即“左加右减, 上加下减”.

(2) 对称变换: $y=f(-x)$ 与 $y=f(x)$ 的图象关于 y 轴对称; $y=-f(x)$ 与 $y=f(x)$ 的图象关于 x 轴对称; $y=-f(-x)$ 与 $y=f(x)$ 的图象关于原点对称; $y=f^{-1}(x)$ 与 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称.

(3) 伸缩变换: $y=kf(x)(k>0)$ 的图象, 可由 $y=f(x)$ 的图象上每一个点的纵坐标伸长 ($k>1$) 或缩短 ($k<1$) 到原来的 k 倍而得到; $y=f(kx)(k>0)$ 的图象, 可由 $y=f(x)$ 的图象上每一个点的横坐标伸长 ($k<1$) 或缩短 ($k>1$) 到原来的 $\frac{1}{k}$ 倍而得到.

(4) 翻折变换: 要得到 $y=|f(x)|$ 的图象, 可先画出 $y=f(x)$ 的图象, 然后“上不动, 下翻上”即可得到; 由于 $y=f(|x|)$ 是偶函数, 要得到 $y=f(|x|)$ 的图象, 可先画出 $y=f(x)$ 的图象, 然后“右不动, 左去掉, 右翻左”即可得到.

考点·函数图象的对称性

注: 看对称, 重点关注定义域, 即 x 的取值范围

一个函数

(1) 若对函数 $y=f(x)$ 的定义域内的任一自变量 x 的值都有 $f(x)=2b-f(2a-x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 成中心对称.

(2) 若对函数 $y=f(x)$ 的定义域内的任一自变量 x 的值都有 $f(x)=f(2a-x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 成轴对称.

两个函数

(3) 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=2b-f(2a-x)$ 的图象关于点 (a,b) 对称.

(4) 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=f(2a-x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称.

例题. 已知函数 $f(x)=(1+2x)(x^2+ax+b)$ ($a,b \in R$) 的图象关于点 $(1,0)$ 对称, 则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的值域为 ().

A. $\left[-8, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

B. $\left[-7, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

C. $\left[-8, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$

D. $\left[-7, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$

① 求出 a, b .

② 求在 $[-1,1]$ 上的单调性

③ 求值域.

例题. 【答案】D. 解析: 由题意得, 函数 $f(x)=(1+2x)(x^2+ax+b)$ 的图象关于点 $(1,0)$ 对称, 则 $\begin{cases} f(1)=0 \\ f(2)=-f(0) \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 3(1+a+b)=0 \\ 5(4+2a+b)=-b \end{cases}$, 解得 $a=-\frac{7}{2}, b=\frac{5}{2}$, 所以 $f(x)=(1+2x)\left(x^2-\frac{7}{2}x+\frac{5}{2}\right)$.

则 $f'(x) = 6x^2 - 12x + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(4x^2 - 8x + 1)$,

令 $f'(x) = 0$, 解得 $x_1 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $x_2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$,



当 $x \in \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$, 则 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减,

当 $x \in \left[-1, 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,





所以 $f(x)_{\min} = f(-1) = -7$, $f(x)_{\max} = f\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

所以函数 $f(x)$ 的值域为 $\left[-7, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$, 故选 D.

考点·指数函数的图象与性质

$y = a^x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
图象		
定义域	$\mathbf{R}$	
值域	$(0, +\infty)$	
性质	过定点 $(0, 1)$	
	当 $x > 0$ 时, $y > 1$; 当 $x < 0$ 时, $0 < y < 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数	当 $x > 0$ 时, $0 < y < 1$; 当 $x < 0$ 时, $y > 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数

例题. 已知 $f(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x} \cos(2x+\alpha)$, $x \in \mathbf{R}$. 则当 $\alpha \in [0, \pi]$ 时, $f(x)$ 的图像不可能是
().
*奇函数. A.B. 偶函数. cos(2x+α) 为奇函数, 取 α = π/2
C.D. 奇函数. cos(2x+α) 为偶函数, 取 α = 0 或 π*





例题. 【答案】A.

解析: 记 $g(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x}$, 得 $g(-x) = \frac{1-3^{-x}}{1+3^{-x}} = \frac{3^x-1}{3^x+1} = -\frac{1-3^x}{1+3^x} = -g(x)$,

对于 A 和 B, 图象关于 y 轴对称, 所以, $f(x)$ 是偶函数, 则有 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $f(x) = -\frac{1+3^x}{1+3^x} \sin 2x$,
 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f(x) > 0$, 所以 A 不可能, B 有可能; 对于 C 和 D, 图象关于原点对称, 所以
 $f(x)$ 是奇函数, 则有 $\alpha = 0$ 或 π , $f(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x} \cos 2x$, 或 $f(x) = -\frac{1-3^x}{1+3^x} \cos 2x$, C 和 D 都有可能, 故选 A.


考点·对数函数的图象与性质

$y = \log_a x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
图象		
定义域	$(0, +\infty)$	
值域	$\mathbf{R}$	
性质	过定点 $(1, 0)$	
	当 $x > 1$ 时, $y > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	当 $x > 1$ 时, $y < 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $y > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

例题. 函数 $y = \ln(x^2 - x + 2)$ 单调递增区间为 _____

例题. 【答案】 $[\frac{1}{2}, +\infty)$. 解析: 由题意, 函数 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上为单调递增函数, 而函数
 $f(x) = x^2 - x + 2$ 的单调递增区间为 $[\frac{1}{2}, +\infty)$, 所以函数 $y = \ln(x^2 - x + 2)$ 的单调递增区间为
 $[\frac{1}{2}, +\infty)$. 考点: 复合函数求单调区间

考点·幂函数的图象与性质






以为正数时, 回归定义, 按
 分数指数幂进行处理.
 以为负数时, 注意
 定义域.

$y = x^a$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$	$\alpha = \frac{1}{2}$	$\alpha = -1$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\{x x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 0\}$
值域	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\{y y \in \mathbf{R} \text{ 且 } y \neq 0\}$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数	非奇非偶函数	奇函数
单调性	增	$x \in [0, +\infty)$ 时, 增;	增	增	$x \in (0, +\infty)$ 时, 减;

	$x \in (-\infty, 0]$ 时, 减		$x \in (-\infty, 0)$ 时, 减
--	------------------------------	--	------------------------------

考点·三角函数的图象与变换


1. 三角函数的图象和性质

函数性质	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$
在一个周期内的图象			
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbf{R}$
对称性	对称轴: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 对称中心: $(k\pi, 0) (k \in \mathbf{Z})$	对称轴: $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 对称中心: $\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right) (k \in \mathbf{Z})$	对称中心: $\left(\frac{k\pi}{2}, 0\right) (k \in \mathbf{Z})$
周期	2π	2π	π
单调性	单调增区间: $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right],$ 单调减区间: $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbf{Z})$	单调增区间: $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 单调减区间: $[2k\pi, \pi + 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$	单调增区间: $\left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right] (k \in \mathbf{Z})$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数

2. 函数 $y = \sin x$ 的图象经变换得到 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象的步骤如下



例题 1. 函数的部分图象如图所示, 则下列说法不正确的是 ().



A. $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

B. $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{5\pi}{12}, 0\right)$ 成中心对称

C. $k(x) = f\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{12}\right) + x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增

D. 已知函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后得到的函数图象关于原点对称

例题 1. 【答案】D. 解析: 根据函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $A=1$, $\frac{3}{4} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{11\pi}{12} - \frac{\pi}{6}$, $\therefore \omega = 2$, 再根据五点法作图可得 $2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 故 A 正确; 当 $x = \frac{5\pi}{12}$ 时, $f(x) = 0$, 即 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{5\pi}{12}, 0\right)$ 成中心对称, 故 B 正确; $k(x) = f\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{12}\right) + x = \sin x + x$, $\therefore k'(x) = \cos x + 1 \geq 0$, 故函数 $k(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 故 C 正确; 把函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后, 得到函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 由于函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 为非奇非偶函数, 故它的图象不关于原点对称, 故 D 错误, 故选 D.

例题 2. 函数 $y = \sin 5x + \cos 5x$ 的最小正周期为_____.

例题 2. 【答案】 $\frac{2\pi}{5}$. 解析: 由三角函数周期性可知, 原函数可化简为 $y = \sqrt{2} \sin\left(5x + \frac{\pi}{4}\right)$, 其 $T = \frac{2\pi}{5}$.

考点·三角函数恒等变换

1. 两角和与差的正弦、余弦、正切公式

(1) $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$.

(2) $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$.

(3) $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$.

2. 二倍角的正弦、余弦、正切公式

(1) $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$.

(2) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha$.

(3) $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$.

3. 辅助角公式

函数 $f(\alpha) = a\sin \alpha + b\cos \alpha$ (a, b 为常数) 可以化为 $f(\alpha) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < 2\pi$), 其中

φ 可由 a, b 的值唯一确定, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$.

带符号

“化繁为简”

复角 → 单角
不同角 → 同角
非同名函数 → 同名
多项式 → 单项式

按顺序记忆

sin 在前
cos 在后

常见的有 $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$;

$$\sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = 2 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right);$$

$$\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha = 2 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right).$$

例题 1. 求函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的增区间.

例题 1. 【答案】 $\left(2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$.

解析: 原式 $= \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 则次函数的增区间为 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq x + \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 解出为 $2k\pi - \frac{3\pi}{4} \leq x \leq 2k\pi + \frac{\pi}{4}$, 所以函数的增区间为 $\left(2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$. 看整体

例题 2. 已知函数 $f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x + a$ 的最大值为 1.

(1) 求常数 a 的值.

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间.

例题 2. 【答案】 (1) $a = -1$; (2) $\left[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}\right] (k \in \mathbb{Z})$.

解析: (1) $f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x + a = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + a$, 所以 $f(x)_{\max} = 2 + a = 1$, 即 $a = -1$;

(2) 当 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 得 $k\pi - \frac{5\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{12}$, 所以 $f(x)$ 得单调区间为 $\left[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}\right] (k \in \mathbb{Z})$.

例题 3. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\alpha \in (0, \pi)$.

求 (1) $\sin \alpha - \cos \alpha$ 的值;

(2) $\cos 2\alpha$ 的值.

例题 3. 【答案】 (1) $\frac{\sqrt{17}}{3}$; (2) $-\frac{\sqrt{17}}{9}$.

解析: (1) 由题意得 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{9}$,

$$\therefore 2\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{8}{9}, (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{17}{9},$$

又 $\because \sin \alpha \cos \alpha < 0, \therefore \sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$,

$$\text{故 } \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{\sqrt{17}}{3}.$$

$$(2) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = (\sin \alpha + \cos \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{17}}{9}.$$

考点·正弦定理

对边比对角

正弦定理应用:

1. 正弦定理: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 其中 R 是三角形外接圆的半径.

(1). 已知三角形的两角与一边, 解三角形

由正弦定理可以变形: (1) $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$; (2) $a=2R\sin A$, $b=2R\sin B$, $c=2R\sin C$; (3) $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$ 等形式, 以解决不同的三角形问题.

(2). 已知三角形的两边和其中一边所对的角, 解三角形

2. 余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC$. 余弦定理可以变形: $cosA = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $cosB = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, $cosC = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

3. $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}absinC = \frac{1}{2}bcsinA = \frac{1}{2}acsinB = \frac{abc}{4R} = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot r$ (r 是三角形内切圆的半径),

并由此计算 R, r .

(1). 已知两边及夹角求第三边

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 a, b 和 A 时, 解的情况如下

	A 为锐角			A 为钝角或直角
图形				
关系式	$a = b \sin A$	$b \sin A < a < b$	$a \geq b$	$a > b$
解的个数	一解	两解	一解	一解

(2). 已知三边求角.

总结: 正、余弦定理构建了三角形中角、边的桥梁. 笔试考试中的会用到正、余弦定理解三角形.

例题 1. $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 且 $2\sin A \cos C = 2\sin B - \sin C$.

(1) 求 $\angle A$ 的大小.

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $a = \sqrt{3}$, 求 $c+b$ 取值范围.

例题 1. 【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $(3, 2\sqrt{3}]$. 解析:

(1) $2\sin A \cos C = 2\sin B - \sin C$, $2a \cos C = 2b - c$, $2a \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 2b - c$, $b^2 + c^2 - a^2 = bc$,

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2} = \cos A, \quad A = \frac{\pi}{3}.$$

(2) $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$, $b = 2\sin B$, $c = 2\sin C$, $b+c = 2(\sin B + \sin C) = 2[\sin B + \sin(\frac{2\pi}{3} - B)] = 3\sin B + \sqrt{3} \cos B = 2\sqrt{3} \sin(B + \frac{\pi}{6})$, 又 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以 $\frac{\pi}{3} < B + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$,

$$\sin(B + \frac{\pi}{6}) \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1], \quad 2\sqrt{3} \sin(B + \frac{\pi}{6}) \in (3, 2\sqrt{3}].$$

例题 2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $b = a \cos C + \frac{\sqrt{3}}{3} c \sin A$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若边长 $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

例题 2. 【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $\sqrt{3}$.

解析: (1) $b = a \cos C + \frac{\sqrt{3}}{3} c \sin A$, 得 $\sin B = \sin A \cos C + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C \sin A$, 即

$$\sin(A+C) = \sin A \cos C + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C \sin A, \text{ 得 } \sin C \cos A = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C \sin A,$$

$$\therefore \tan A = \sqrt{3}, A = \frac{\pi}{3}.$$

$$(2) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \text{ 即 } b^2 + c^2 - 4 = bc, (b+c)^2 - 4 = 3bc,$$

$$\therefore 3bc = (b+c)^2 - 4 \geq (2\sqrt{bc})^2 - 4, \text{ 即 } bc \leq 4 \text{ (当 } b=c \text{ 时等号成立),}$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4} bc \leq \sqrt{3}.$$